

# 华冠一次性揸针 无菌揸针 揸针 耳针 皮内针

产品名称	华冠一次性揸针 无菌揸针 揸针 耳针 皮内针
公司名称	太原市天合祥商贸有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:苏食药监械（准）字2012第2270112号 产品注册证:苏食药监械（准）字2012第2270112号 灭菌方式:环氧乙烷
公司地址	太原市迎泽区建设南路73号中正悦湾33幢5号楼0020-0021号
联系电话	0351-4296922 13934226163

## 产品详情

揸针，是一种形似图钉状的针，针柄扁平状，针体约一至二分长。用时可以将针体揸入皮下。一般多用于皮内针或耳针，供皮下埋藏用。

皮内针疗法是古代针刺留针方法的发展。是将针具刺入皮内，固定后留置一定时间，利用其持续刺激作用，来治疗疾病的一种方法。本法可以给穴位以持续刺激，减少反复针刺的麻烦，病人还可以自己手压埋针以加强刺激。使用方法 揸钉型皮内针：多用于面部及耳穴等须垂直浅刺的部位。用时以小镊子或持针钳夹住针柄，将针尖对准选定的穴位，轻轻刺入，然后以小方块胶布粘贴固定。另外，也可以用小镊子夹针，将针柄放在预先剪好的小方块胶布上粘住，手执胶布将其连针贴刺在选定的穴位上。

埋针时间的长短，可根据病情决定，一般1-2天，多者可埋6-7天，暑热天埋针不宜超过2天，以防止感染。2次埋针间隔时间：同一穴位起针后1周可再次埋针，不同穴位可以连续进行。若为疼痛疾病，埋针时间以疼痛缓解为度，不一定持续数日。禁忌症关节处、红肿局部、皮肤化脓感染处、紫癜和瘢痕处，均不宜埋针。皮肤过敏患者、出血性疾病患者也不宜埋针。注意事项穴位、针具、镊子都要常规消毒。埋针处不宜水浸泡。夏季多汗时，要检查埋针处有无汗浸皮肤发红等。如见发红、疼痛要及时检查，有感染现象立即取针。埋针发生疼痛可以调整针的深度、方向，调整无效时，可能有炎症发生，应取针。患者可以用手指间断按压针柄，以加强刺激量，提高效果。但应注意手的卫生。若埋针处已发生感染，应

给予常规外科包扎处理。如有发热等全身反应时，适给予抗生素或中药清热解毒药治疗

本产品的药（械）准字是苏食药监械（准）字2012第2270112号，产品注册证是苏食药监械（准）字2012第2270112号，灭菌方式是环氧乙烷，有效期是24（月），一次性使用是是，规格是0.22\*1.5，品名是华冠，数量是100支/盒