

秀之园供应 大丽花 庭院种植观花植物

产品名称	秀之园供应 大丽花 庭院种植观花植物
公司名称	沭阳县秀之园花卉园艺场
价格	面议
规格参数	品种:丽花 主要观赏部位:观花 花型:单瓣
公司地址	中国 江苏 宿迁市 江苏省沭阳县颜集镇埝下花木区
联系电话	86 0527 83396913 13951191807

产品详情

批发各种大丽花苗，种类繁多，量大优惠，每一种大丽花的价格也不一样，购买前请咨询客服或联系经理，联系方式：139 5119 1807

大丽花

大丽花，别名大理花、天竺牡丹、东洋菊、大丽菊、地瓜花，菊科、大丽花属植物，多年生草本，有巨大棒状块根。茎直立，多分枝，高1.5-2米，粗壮。原产于墨西哥，墨西哥人把它视为大方、富丽的象征，因此将它尊为国花。目前，世界多数国家均有栽植，选育新品种时有问世，据统计，大丽花品种已超过3万个，是世界上花卉品种最多的物种之一。大丽花花色花形誉名繁多，丰富多彩，是世界名花之一。

大丽花花瓣有重瓣和单瓣。重瓣的大丽花，有种千瓣花，白花瓣里镶着红条纹，宛如玛瑙，妖艳非凡；而单瓣的品种“红世纪”，花瓣虽少，却显得简单朴素，别有一种情趣。

重瓣的大丽花雍容华贵，富丽堂皇，堪同牡丹媲美，因此又得名“天竺牡丹”。但是花儿的构造毕竟同牡丹不同。牡丹花的花心里有大簇的花蕊，而大丽花的花，不能称为“朵”，只能叫它“花篮”、“花盘”。因为它是由无数朵小花排列而成的。这些小花就是大花中的“花瓣”，而且它们会随着开放

的先后陆续结实。这同它的近亲菊花完全一样，是菊科植物的主要特征。

大丽花的花朵，花瓣排列得十分整齐，不像牡丹花那样大小错综，自然奔放而富有浪漫色彩。但是，大丽花也有花瓣卷曲多变的，如一种叫“仙人掌”的，就是这样。

大丽花栽培品种繁多，全世界约3万种。按花朵的大小划分为：大型花（花径20.3厘米以上）、中型花（花径10.1~20.3厘米）、小型花（花径10.1厘米以下）等三种类型。按花朵形状划分为：葵花型、兰花型、装饰型、圆球型、怒放型、银莲花型、双色花型、芍药花型、仙人掌花型、波褶型、双重瓣花型、重瓣波斯菊花型、莲座花型和其他花型等11种花型。其主要栽培品种有：

1. 寿光 花色鲜粉，花瓣先端白色，花朵艳丽，花径12厘米，株高110厘米。为夏、秋季切花品种。
2. 朝影 花鲜黄色，花瓣先端白色，重叠圆厚，不露花心，花径12厘米。株高120厘米。易栽培。
3. 丽人 花紫红色，花瓣先端白色，花径10厘米。株高100厘米，直立性强。为小型切花品种。
4. 华紫 花纯紫色，花径12厘米。紫色系中最佳品种。
5. 瑞宝 花橙红色，不露心，呈睡莲形状开放，花径12厘米。极早花品种。宜大棚栽培。
6. 福寿 花鲜红色，花瓣先端有白色斑痕。
7. 珠宝 夏、秋季朱红色，10月后花橙红色，花径12厘米。
8. 新晃 花鲜黄色，花瓣先端白色，花多。株高90厘米。
9. 红妃 花深红色。叶直立，枝多。容易栽培。
10. 新泉 花鲜红色，花瓣边白色，花形美。极早花品种。
11. 红簪 花粉色，花瓣浑圆，玫瑰形，花径12厘米。植株紧凑协调，非常美丽。

多用扦插和播种繁殖，以扦插为主，一般在9-10月份进行。

上盆时间一般在10月中旬，每盆1-2株；

当苗长高10-12厘米时，留2个节摘顶，培养每盆枝条达6-8枝，最后一次摘心在离春节前40-50天进行，以便控制春节期间开花；

浇水：每天浇水2-3次，需要开花前可适当控水促花；

施肥：前期以施氮肥为主，后期施磷钾肥为主。一般每10天施无机肥一次，每月施有机肥一次

病虫害防治：定期喷药保护脚叶；

绑竹：在最后一次摘心并定枝后，开始绑竹，每枝条一支竹片，同时把过多的侧枝摘除，以便通风；

摘蕾：当花蕾长到花生米大小，每枝留2个花蕾，其它花蕾摘除；

定蕾：当花蕾露红时，每枝只留1个花蕾。

盆栽关键

盆栽大丽花生长好坏的关键，在于加强对植株盆土的管理，并给予充分的光照，勤施水、肥，及时进行整形和修剪等的管理。

(1)加强对盆土的管理。大丽花适生于疏松、富含腐殖质和排水性良好的砂壤土。盆栽大丽花定植用土，一般以菜园土(50%)、腐叶土(20%)、砂土(20%)和大粪干(10%)配制的培养土为宜，板结土壤容易引起渍水烂根，不能用。在日常管理在及时松土，排除盆中渍水，因为大丽花肉质块根在土壤中含水量过多而空气通透不良时即腐烂。

(2)光照。大丽花喜光不耐荫，若长期放置在荫蔽处则生长不良，根系衰弱，叶薄茎细，花小色淡，甚至有的不能开花。因此，盆栽大丽花应放在阳光充足的地方。叶处平等互利莫明充足的光照，每日光照要求在6小时以上，这样植株茁壮，花朵硕大而丰满。若每天日照少于4小时，则茎叶分枝和花蕾形成会受到一定影响，特别是阴雨寡照则开花不畅，茎叶生长不良，且易患病。

(3)勤浇水。大丽花喜水但忌积水，既怕涝又怕干旱，这是因为大花系肉质块根，浇水过多根部易腐烂。但大丽花枝叶繁茂，蒸发量大，又需要较多的水分，如果因缺水萎蔫后没能及时补充水分，再受阳光照射，轻者叶片边缘枯焦，重者基部叶片脱落，因此。浇水要掌握“干透浇透”的原则，一般生长前期的小苗阶段，需水分有限，晴天可每日浇一次，保持土壤稍湿润为度，太干太湿均不合适，生长后期，枝叶茂盛，消耗水分较多，晴天或吹北风的天气。注意中午或傍晚容易缺水，应适当增加浇水量。

(4)适当施肥。大丽花是一种喜肥花卉，从幼苗开始一般每天10-15天追施一次稀薄液肥。现蕾后每7-10天施一次。到花蕾透色时即应停浇肥水。气温高时也不宜施肥。施肥量的多少要根据植株生长情况而定。凡叶片色浅而瘠薄的，为缺肥现象；反之，肥料过量，则叶片边缘发焦或叶尖发黄，叶片厚而色深浓绿，则是施肥合适的表现。施肥的浓度要求一次比一次加大，这样能使茎秆粗壮。

(5)整形和修剪。盆栽大丽花的整枝，要根据品种灵活掌握。一般大型品种采用独本整形，中型品种采用4本整形。独本整形即保留顶芽，除去全部腋芽，使营养集中，形成植株低矮、大花型的独本大丽花。4本大丽花是将苗摘心，保留基部两节，使之形成4个侧枝，每个侧均留顶芽，可成4干4花的盆栽大丽花。

(6)插杆扶株。大丽花的茎既空又脆，容易被风吹倒折断，应及时插竹扶持，插竹还可以避免枝条生长弯曲，提高盆栽观赏价值。当植株长高至30厘米以上时，应在每一枝条旁边插一小竹、并用麻皮丝

(或细线绳)绑扎固定；随着植株越长越高，还应及时换上更长的插竹，最后插的小竹要顶在花蕾的下部

。

(7)保护植株安全越冬。大丽花不耐寒(主要是块根不能受冻)，11月间，当枝叶枯萎后，要将地上部分剪除，搬进室内，原盆保存。也可将块根取出晾1-2天后埋在室内微带潮气的砂土中、温度不超过5度，翌年春季再行上盆栽植。

本产品的品种是丽花，主要观赏部位是观花，花型是单瓣，花色色系是多色系，叶色色系是绿色系，花期是5-6（月），果期是00（月），株高是30（cm），地径/蓬径是10（cm），品种纯度是98（%），品种来源是国外引进种，光照习性是喜阳，干湿习性是中性，生长适温是20（ ），是否耐寒是否，是否做一二年生栽培是是，园林用途是花境,花坛,盆栽,地被