

# 德国巴斯夫苞卫 30%苯吡唑草酮 玉米 甜玉米 制种玉米 除草剂

产品名称	德国巴斯夫苞卫 30%苯吡唑草酮 玉米 甜玉米 制种玉米 除草剂
公司名称	莱阳市照旺庄盛世兴农农资门市部
价格	面议
规格参数	有效成分:苯吡唑草酮 有效含量 :30 ( % ) 用量:75-90 ( g/ha )
公司地址	莱阳市照旺庄镇祝家疃村
联系电话	13853578622

## 产品详情

巴斯夫苞卫，苯吡唑草酮，5ml苞卫+90ml助剂+70g莠去津，玉米田最安全、除草效果最好的除草剂

作用特点：

在目前市场上所销售的玉米田当家茎叶处理除草剂中，苞卫对玉米的安全性最好。

广谱苗后除草剂，有效防除玉米地一年生禾本科和阔叶杂草,对一年生禾本科杂草的杀草谱比磺酰脲类,硝磺草酮广，能更有效的防治一些特定的禾本科杂草。

比常规苗后除草剂具有更宽的使用期，能让农户在较合适的杂草出苗、农时等情况时施药。

与莠去津等有很好的混用兼容性。

产品套装包含5ml苞卫+90ml助剂+70g莠去津

作用机理：

苞卫间接影响类胡萝卜素的合成，在光照下，干扰叶绿体的合成和功能，最终导致严重的白化,组织坏死。同时，杂草的生长受到抑制。

苗后施用苞卫后，敏感杂草通过叶片吸收，并在植物体内向上、和向下双向传导,并很快停止生长。杂草地上部份在施药后2~5天内出现白化中毒症状，生长点、叶片和叶脉的中毒症状最明显,白化的组织逐渐坏死，整个植株枯死,根据天气环境不同,需要10- 15天左右。苞卫最大的优点就是安全性对绝大多数的玉米具有良好的选择性，包括常规玉米、甜,糯玉米能在玉米苗后整个生长期施用(常规玉米苗后除草剂在玉米2叶期前,6叶期后用药不安全)。苞卫对大多数一年生玉米田常见杂草,尤其是禾本科杂草,有良好防效另外,苞卫加入阿特拉津,死草速度加快,2-4天杂草明显出现白化症状,2周内杂草彻底死亡,对玉米施药期晚的大草,以及鸭跖草,铁苋菜等恶性杂草有较好防治效果.持效期长,苞卫混用阿特拉津,控

草期能达到35天以上.苞卫为德国巴斯夫专利产品。

本产品的有效成分是苯唑草酮，有效含量 是30（%），用量是75-90（g/ha），用途是玉米田除草，生产厂家是巴斯夫欧洲公司，品牌是巴斯夫，剂型是悬浮剂