普力克 霜霉威 水剂 722克/升（%）

产品名称	普力克 霜霉威 水剂 722克/升（%）
公司名称	山东东方誉源农资连锁股份有限公司
价格	面议
规格参数	剂型:水剂 有效成分含量:722克/升（%）
公司地址	山东省寿光市古城街道安顺街北、兴源路东
联系电话	18866711841

产品详情

商品名	普力克
有效成分及含量	霜霉威盐酸盐：722克/升
剂型	水剂
净含量	20ml
生产企业	德国拜耳

本产品为低毒内吸性卵菌纲杀菌剂。具有施药灵活的特点，可采用苗床浇灌处理防治苗期猝倒病、疫病；叶百喷雾防治霜霉病、疫病等，均有良好的预防保护和治疗效果。

作物	防治对象	施药 方法	制剂用量	有效成分用量	施药时期
黄瓜	苗床： 猝倒病疫病	苗床 浇灌	400-600倍 （5-7.5毫升/平方米）	3.6-5.4公顷	播种时及移栽前
黄瓜	本田：	叶面	600-1000倍	649.8-1083克/公顷	发病前或初期喷药，每隔7-10天

	霜霉病	喷雾	(60-100毫升/亩)		喷药一次
甜椒	疫病	叶面 喷雾	600-900倍 (72-108毫升/亩)	775.5-1164克/公顷	发病前或初期喷药，每隔7-10天喷药一次

苗床浇灌的用药方法:

在播种时及幼苗移栽前进行苗床浇灌,每平方米药液量2-3升,使药液充分到达根区,浇灌后保持土壤湿润。

距收获前安全间隔期:黄瓜3天。

注意事项与急救措施：

1、避免吸入、接触皮肤及眼睛；

2、使用时穿工作服戴手套，如药液溅到身上，立即用水冲洗。

3、避免药剂直接接触到皮肤及眼睛，一旦接触，立即用大量水清洗。

4、用过后的空包装应妥善处理，避免污染河流、湖波等水源。

5、因疏忽或误用而发生中毒现象（无力、运动失调、痉挛等），不可引吐，可用清水漱口，并立即携带此标签就医，对症治疗。

贮存和运输方法：

1、本品应以原包装贮存于阴凉、干燥和通风处。

2、本品贮存应远离食物和饲料，并放置于儿童接触不到的地方，加锁保管。

3、运输时应注意防水防潮，避免雨淋；搬运时轻搬轻放，不可倒置。

本产品的剂型是水剂，有效成分含量是722克/升（%）