先正达适乐时（咯菌腈）根腐 立枯 枯萎 灰霉花卉果蔬杀菌剂10ml

产品名称	先正达适乐时（咯菌腈）根腐 立枯 枯萎 灰霉花卉果蔬杀菌剂10ml
公司名称	寿光市众鑫益合农资有限公司
价格	面议
规格参数	有效含量≥:25（%） 剂型:乳剂
公司地址	寿光市区新天地电器商城5号楼19-1号房
联系电话	05365851597 15263647596

产品详情

产品规格：10ml*50袋*8盒

瓜类枯萎病由镰刀菌（fusarium spp）侵染引起，是瓜类生产中发生最严重的病害之一，尤以重茬地发生严重，发病严重时造成瓜苗成片死亡。目前常用的药剂对瓜类枯萎病的防治效果不够理想，难以有效地控制病害的发生为害。今年各地用适乐时防治瓜类的枯萎病，使用后一致反映其效果良好。多处试用表明：⑴施用适乐时可有效防止枯萎病的发生，枯萎病发生后使用适乐时可迅速控制其发展。⑵适乐时可兼治瓜类炭疽病、蔓枯病、灰霉病等，一次用药（喷雾）可防治多种病害。⑶安全性好，瓜类作物各个生长时期均适用。适乐时防治枯萎病的使用方法：⑴种子处理，用适乐时进行种子包衣（10毫升可以处理2公斤种子）。⑵苗床浇洒淋根处理，在移栽前1— 2天用适乐时2000倍液浇洒苗床，也可在起苗后用适乐时2000倍液淋根或蘸根。⑶在瓜类移栽时用4000倍液浇定根水，亩用药液量约为300公斤（需用适乐时70—80毫升）。⑷在枯萎病易发时期用适乐时2000倍进行灌根，亩用药液量约为150公斤。进行灌根时可将喷雾器的喷头去掉，对准植株茎基部，让药液缓慢进入土壤。⑸病害初发时及早用药防治，根茎基部出现水渍状的病状后立即用适乐时1500倍液灌根及喷雾。特别推荐：2.5%适乐时悬浮剂防治枯萎病、灰霉病、立枯病、纹枯病、炭疽病、早疫病。国 外 用 法 用 量 参 考作物 病害 使用倍数 用法桃
褐腐病、炭疽病 1200 喷雾瓜类 枯萎病 2000 种子包衣、灌根及叶面喷雾立枯病 2500
种子包衣、苗床土壤处理炭疽病 1200 喷雾蔓枯病 1500 喷雾白绢病 1000 喷雾葡萄 灰霉病 3000 喷雾炭疽病 1200 喷雾草坪 纹枯病 1500 喷雾及土壤处理草莓 灰霉病 3000 喷雾褐腐病 1200 喷雾根腐病 1500
灌根辣椒、番茄 早疫病 2500 喷雾枯萎病 2000 包衣、灌根炭疽病 1200 喷雾灰霉病 3000 喷雾豆类 根腐病 2000 包衣、灌根立枯病 2500 包衣、灌根灰霉病 3000
喷雾[注*]：2.5%适乐时悬浮剂用于种子包衣处理的用药量：1公斤种子用4－－8毫升。

本产品的有效含量≥是25（%），剂型是乳剂