

# 进口牧草种子 狼尾草种子 杂交狼尾草种子 台湾杂交甜象草种

产品名称	进口牧草种子 狼尾草种子 杂交狼尾草种子 台湾杂交甜象草种
公司名称	沭阳县民丰园林绿化苗木场
价格	面议
规格参数	种类:种子 品种:狼尾草 等级:1
公司地址	江苏 沭阳县 颜集镇房许村叶圩组27号
联系电话	86-052783388558 15250733611

## 产品详情

### 栽培技术

#### 播种

由于种子小，幼芽顶土能力差，整地的好坏对它出苗影响很大。因此整地要精细，利于出苗。当温度稳定达到15摄氏度时播种为宜，在5月上、中旬播种，播期推迟到6月底，也能得到较高的草产量。播种时要掌握土壤水分适宜，播后覆土深度1.5厘米左右。通过播种后5-6天即可出苗。刈草一般采用条播，亩播量0.7-1.0公斤，行距50厘米；也可以育苗移栽，5-6张叶片时移栽到大田。移栽密度为每亩4000-5000株。行距45厘米，株距20-25厘米。

为了防治蚂蚁等地下害虫对种子或幼苗危害，必须用农药拌种或施毒土。狼尾草苗期生长慢，常易被杂草侵入，及时进行中耕除草2次，促进早发分蘖。一旦开始分蘖即可迅速生长。苗期要争取全苗，如遇干旱要及时灌溉。

#### 施肥

狼尾草是一种需肥较多的牧草，只有在高施肥量的情况下，才能发挥它的生产潜力，一般每亩使用优质有机肥1500公斤，缺磷的土壤，亩施过磷酸钙15-20公斤作基肥，每次刈割后都要施追肥一次，每亩使用尿素5公斤（或其它氮肥、人畜粪尿）作追肥。

#### 刈割利用

作青饲料时，一般在拔节后刈割，刈割高度依饲养对象而定，饲喂鱼、兔、鹅（或猪）植株70-80厘米时，几乎全是叶片；饲喂牛、羊时，株高一般为1-1.3米，刈割留茬高度10-15厘米，切忌齐地割，否则会影响再长。如留茬过高，从节芽发生的分枝生长不壮也会影响产量。不要在阴雨天刈割，否则会造成严重缺株而减产。调制青贮料在抽穗后刈割，调制方法与玉米相同。

## 经济价值

杂交狼尾草茎叶柔嫩，适口性好，食草家畜和鱼类均喜采食。杂交狼尾草营养价值较高，营养生长期株高1.2m时，在茎叶干物质中分别含粗蛋白质10%，粗脂肪3.5%，粗纤维32.9%，无氮浸出物42.4%，粗灰分10.2%。同时，它也是食草家禽和食草性鱼类的优质青饲料。其产草高峰和鱼的需食高峰相一致，草鱼对杂交狼尾草的粗蛋白质消化率为82.71%。例如，用做养牛、羊的青饲料，每年刈割5~6次，用做鱼、兔、鹅、猪等畜禽的育饲料，每年刈割8~10次。除青刈外，也可以晒制干草或调制青贮料。供草期6~10月，对缓和长江中下游地区夏季高温缺青饲的矛盾，具有一定的作用。

本产品的种类是种子，品种是狼尾草，等级是1，品种纯度 是96.0（%），净度 是98.0（%），发芽率是90.0（%），水分 是5.0（%）