

出售新采收毛桃种子 量大从优 保证发芽率

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 出售新采收毛桃种子 量大从优 保证发芽率 |
| 公司名称 | 沐阳县颜集镇花蝴蝶园艺场 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 种类:种子 品种:毛桃 等级:1 |
| 公司地址 | 沐阳县颜集镇沙湾村李湾组 |
| 联系电话 | 05271825244-822 15951190050 |

产品详情

中文名称：桃树
：科：蔷薇科
外文名称：peach
：亚属：桃亚属
别称：桃子、桃仔
：分布区域：我国
二名法：prunus persica
：世界各
地广
为栽
培

桃营业价值：桃是深受广大人民群众喜爱的水果之一。不仅外观艳丽，汁多味美，而且营养丰富。每100克果肉含糖7-5克，有机酸0.2-1.9克，蛋白质0.4-1.8克，脂肪0.1-1.5克，维生素c31毫克，维生素b20.2毫克。桃除鲜食外，还可制作糖水罐头、桃酱、桃汁、桃干等多种加工制品。根、叶、花、仁可以入药，具有止咳活血、杀虫之功效。

栽培技术：桃树是喜光树种，分枝力强，生长快，

如管理不周，容易徒长，影响光照、引起枯枝空膛，结果外移，造成树势早衰，降低产量和品质。因此，抓好与修剪相关的措施，特别是夏剪十分重要

可供观赏 桃的品种除了采果品种外，亦有观花品种，早春盛开，娇艳动人，是优美的观赏树。果肉清甜味甘。除生食之外亦可制干、制罐。果、叶均含杏仁甙，干全株均可入药。

毛桃树为落叶小乔木，高4-10m。叶卵状披针形或圆状披针形，长8-12cm，宽3-4cm，边缘具有细密锯齿，两边无毛或下面脉腋间有鬃毛。

毛桃落叶乔木，最高可达10米，树皮光滑暗紫红色、枝纤细，上展，紫红色，幼时无毛。叶片狭卵状披针形或椭圆状披针形，近基部最宽，先端长渐尖，基部宽楔形，两面均无毛叶柄纤细，早落。花单生，先于叶开放；花梗极短，无毛；花瓣倒卵形或近圆形，淡粉红色或白色；基部具短爪；雄蕊约30枚，长短不等，长与花瓣近等或稍短；花柱线形，稍长于雄蕊，基部被柔毛。子房密被柔毛。果实球形，先端圆钝或微尖，稍黄色，密被短柔毛；果肉薄，干燥，离核性；果核小，具沟纹。花期3-4月，果期8月。中国全境都可以培育种植，桃树繁殖方式多样而且栽培技术易操作，种植期间对常见病虫害需要进行有效的防治。它的种类繁多，品名纷呈。

花单生，先叶开放，近无柄；萼筒钟，有短绒毛，裂叶卵形；花瓣粉红色，倒卵形或矩圆状卵形。

果球形或卵形，径5~7公分，表面有短毛，白绿色，夏末成熟；熟果带粉红色，肉厚，多汁，气香，味甜或微甜酸。核扁心形，极硬。根系较浅，但须根多，发达。它的寿命较短。一般春季开花夏末秋初结实，也有的品种夏季结果。

喜光，不耐阴。适温和气候，耐寒、耐旱，忌涝。喜肥沃、排水良好的土壤，碱性土、粘重土均不适宜。

适宜生长在光照良好的向阳或半阳坡地。土层深厚、富含腐殖质、排水良好、疏松肥沃、保水、保肥能力强的土壤最适宜毛桃的生长。

苗木选择

根据土壤、气候、管理水平及当地市场行情，选择丰产性好、产销对路的优良品种，并做好早、中、晚熟品种的搭配。

建园定植

选择排水良好、土层深厚、pH值5.5~6.5微酸性砂壤或砂砾壤土，进行挖大穴定植；低丘坡地应修筑梯地，每亩定植密度平地40~50株，山地50~60株。

施肥追肥

基肥提倡冬肥秋施，以有机肥为主，占全年施肥量的60%~70%，一般每亩施厩肥2000kg或每亩施果树专用肥150kg；追肥的次数、时间、用量等根据品种、树龄、栽培管理方式、生长发育时期以及外界条件等而有所不同，一般以芽前肥、壮果肥和采后肥为主。

整形修剪

(1)树形与树体结构：树形为三主枝自然开心形。树体结构，成年树高度维持在2.5~3米左右，干高30~40厘米，有3个主枝，各占120°方位角，每一主枝配1~2个副主枝，开张角度75°左右。

(2)树形培养：定植当年于50~60厘米处定干，剪口下整形带内需有3个以上健壮芽。定植后生长的第一年，选留长势较强，方位角较好的新梢，培养为主枝，其余新梢可疏除或扭枝作辅养枝。定植后第二年在距主干50~60厘米处选侧生强枝，开张角度好，培养副主枝，同时在主枝和副主枝上培养大小结果枝组。

(3)修剪：休眠期（冬季）修剪。在落叶后至萌芽前均可进行，修剪采取短截与疏删相结合，以及长放、回缩、圈枝等措施。结果枝修剪：长果枝，约剪去枝长的三分之一；中果枝除疏剪密生枝外，一般不短截；短果枝宜每隔10厘米左右保留1个枝。留枝量根据立地条件、管理水平、树龄、树势和产量要求而定。生长期修剪主要有：花后复剪、除萌抹芽、疏枝、扭枝、摘心、拉枝、剪梢、挪枝等技术措施。

果实管理

毛桃着果率高，必须进行疏果，控制留果量。疏果宜分2次进行，分别在4月下旬~5月上旬和5月中下旬，一般短果枝留1只果，中果枝留2只果，长果枝留3~5只果。定果后及时喷药套袋。果实采收期根据品种特性而定，以采收8成成熟果为宜。毛桃苗的作用

1. 作为嫁接的优良砧木：毛桃是桃、杏、李、梅等果树的常用砧木树种，与紫叶李、紫叶矮樱等绿化树

种的嫁接亲和力也很强，也可作为观赏桃等花木苗的嫁接砧木，因此为广大苗木生产者广泛应用。用毛桃作砧木嫁接的苗木生长快、结果早、果实大、浆汁多、品质也好，而且嫁接伤口自然愈合好，嫁接成活率非常高，嫁接的亲和力也好，不存在前期不亲和与后期不亲和，不会出现大小脚现象。

2. 作为绿化的首选苗木：毛桃根系发达，耐瘠薄，栽植成活率特高，生长速度特快，当年播种的毛桃苗最高可长到2米多高。栽植第二年可长高到3-4米，同时树径增粗，冠幅扩大。

3. 作为占地的最佳选择：在遇到国家征地时为了多获得补偿款，马上买一些苗木栽在地里就称为占地苗。占地苗的首选是毛桃苗。

一是毛桃苗价格便宜，一般来说50公分的0.5元，一米高的1元；

二是成活率最高，基本上栽着就会活；

三是抗病抗虫，容易管理；

四是长势特快，第二年就可以达到2米左右，地径3公分左右；

五是补偿标准也还高。

本产品的种类是种子，品种是毛桃，等级是1，品牌是登海种业，品种纯度 是93.0（%），净度 是95.0（%），发芽率 是90.0（%），水分 是5.0（%）