10%阿莫西林可溶性粉--太初动物药业

产品名称	10%阿莫西林可溶性粉--太初动物药业
公司名称	河南太初动物药业有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:迪冉 型号:预混剂 100g:10袋
公司地址	河南省郑州市金水区中州大道附近
联系电话	0371-55825821 15638217897

产品详情

【主要成分】阿莫西林。

【性　状】本品为类白色粉末。

【药理作用】药效学 阿莫西林属β-内酰胺类抗菌药，具有广谱抗菌作用。抗菌谱及抗菌活性与氨苄西林基本相同，对大多数革兰氏阳性菌的抗菌活性稍弱于青霉素，对青霉素酶敏感，故对耐青霉素的金黄色葡萄球菌无效。对革兰氏阴性菌，如大肠杆菌、变形杆菌、沙门氏菌、嗜血杆菌、布鲁氏菌和巴氏杆菌等有较强的作用，但这些细菌易产生耐药性。对铜绿假单胞菌不敏感。由于其在单胃动物的吸收比氨苄西林好，血药浓度较高，故对全身性感染的疗效较好。适用于敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、皮肤及软组织等全身感染。

药动学 阿莫西林对胃酸相当稳定，单胃动物内服后74%～92%被吸收。胃肠道内容物影响其吸收速率，但不影响吸收程度，故可混饲给药。同等剂量内服后，阿莫西林血清浓度比氨苄西林高1.5～3倍。

【药物相互作用】(1)本品与氨基糖苷类合用，可提高后者在菌体内的浓度，呈现协同作用。

(2)大环内酯类、四环素类和酰胺醇类等快效抑菌剂对本品的杀菌作用有干扰作用，不宜合用。

【适 应 证】主要用于对阿莫西林敏感的革兰氏阳性球菌和革兰氏阴性菌感染，如金黄色葡萄球菌病、大肠杆菌病、鸡白痢和传染性鼻炎等。

【用法与用量】以本品计。内服:一次量，每1kg体重，鸡0.2～0.3g，一日2次，连用5日；混饮:每1L水，鸡0.6g，连用3～5日。

【不良反应】按规定剂量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】(1)现配现用。

(2)蛋鸡产蛋期禁用。

【休 药 期】鸡7日。

【规　格】10%

【包　装】100g/袋

【贮　藏】遮光，密封保存。