

鸭疫速效----控制鸭疫里默氏杆菌的速效制剂

产品名称	鸭疫速效----控制鸭疫里默氏杆菌的速效制剂
公司名称	山东迅达康兽药有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:迅达康兽药 型号:兽药字(2012)151042538
公司地址	山东省济南市农业高新技术开发区迅达康路666号
联系电话	0531-87400666 18053148699

产品详情

[兽药GMP验收通过企业](#)

证书编号：(2014)兽药GMP证字153号 执行标准：《中国兽药典》二〇一〇年版一部
批准文号：兽药字(2012)151042538 兽药生产许可证号：(2014)兽药生产证字15104号

鸭疫速效 氟苯尼考粉

兽用处方药

【兽药名称】通用名称：氟苯尼考粉 英文名称：Florfenicol Powder 汉语拼音：Fubennikao Fen
【主要成分】氟苯尼考**【性状】**本品为白色粉末。**【药理作用】**药效学 氟苯尼考属于酰胺醇类广谱抗菌药，对多种革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及支原体等有较强的抗菌活性。氟苯尼考主要是一种抑菌剂，通过与核糖体50S亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成。体外氟苯尼考对许多微生物的抗菌活性与氯霉素、甲砒霉素相似或更强，一些因乙酰化作用对氯霉素耐药的细菌，如大肠杆菌、克雷伯氏肺炎杆菌等仍可能对氟苯尼考敏感。溶血性巴氏杆菌、多杀巴氏杆菌和猪胸膜肺炎放线杆菌对氟苯尼考高度敏感。**药动学** 氟苯尼考肌内服吸收迅速，约1小时后血液中可达到治疗浓度，1-3小时即可达峰值血药浓度。生物利用度达80%以上。氟苯尼考在动物体内分布广泛，能透过血脑屏障。主要原药从尿排出，少量随粪便排出。**【药物相互作用】**(1)大环内酯类和林可胺类与本品的作用靶点相同，均是和细菌核糖体50S亚基结合，合用时可产生相互拮抗作用。(2)可能会拮抗青霉素类或氨基糖苷类药物的杀菌活性，但尚未在动物体内得到证明。**【适应证】**用于敏感细菌所致的猪、鸡及鱼的细菌性疾病。例如，溶血性巴氏杆菌、多杀性巴氏杆菌和猪胸膜肺炎放线杆菌引起的猪呼吸道感染，沙门氏菌引起的伤寒和副伤寒，鸡霍乱、鸡白痢、大肠杆菌病等；鱼类巴氏杆菌、弧菌、金黄色葡萄球菌、嗜水单胞菌、肠炎菌等引起的鱼类细菌性败血症、肠炎、赤皮病等。**【用法与用量】**以本品计。内服：每1kg体重，猪、鸡0.4~0.6g。一日2次，连用3~5日。以本品计

。拌饵投喂：每1kg体重，鱼0.2~0.3g。一日1次，连用3~5日。【不良反应】

(1) 本品高于推荐剂量使用时有一定的免疫抑制作用。(2) 有胚胎毒性，妊娠期及哺乳期家畜慎用。

【注意事项】(1) 为避免食用鸡蛋中药物残留，蛋鸡产蛋期禁用。(2)

肾功能不全患畜需适当减量或延长给药间隔时间。(3) 疫苗接种期或免疫功能严重缺损的动物禁用。

【休药期】猪20日，鸡5日；鱼375度日。【规格】5%【包装】500g/袋×20袋/箱

【贮藏】密闭，在干燥处保存。