

供应5米高优质陕西白皮松树苗

产品名称	供应5米高优质陕西白皮松树苗
公司名称	大汉白皮松绿化工程有限公司
价格	4010.00/棵
规格参数	胸径:8cm 株高:5m 土球直径:80cm
公司地址	陕西省西安市蓝田县辋川乡
联系电话	029-68956136 17792284668

产品详情

白皮松是一种优良的城市绿化树种，给我们的城市增添了不少的靓丽景色。它身姿挺拔，四季常绿，干皮斑驳，所以深受大家的喜爱，在我们的城市中有着不小的“家族势力”。白皮松在市场上也要比一般的树种受欢迎一些，价格也高，所以种植培育的人不少。今天主要介绍的是白皮松树苗的苗期管理技术：

消毒：种子播上三周后，会有个别小苗出土，没出土的种子均已发芽。

这时，要用1200倍敌克松溶液进行第一次喷雾消毒工作，这是出好苗、出齐苗的第一关键，必须认真做好。每两周对种苗消毒一次，如用多菌灵或75%代森锰锌600倍液交叉喷雾。(每7-10d喷1次杀菌剂(0.3%~0.4%KMnO 或2%FeSO)防治立枯病)

通风去膜遮阴：当苗出齐后，逐渐加大通风时间，以至全部去掉薄膜，就可以进入常规管理，除草、松土，这段时间要注意看雀，防止鸟害。

幼苗较耐荫，去掉薄膜后应随即盖上遮阴网，到4月中旬，罩上50%遮阳网，防止日灼。高架遮阳网的处理：当年生小苗最怕阳光直射，导致生长不良，针叶发黄，所以苗出齐后必须上遮阳网，9月中旬小苗半木质化后，再拆去遮阳网，到第二年5月中旬上网，8月中旬拆网，如果按以上方法精心管理和养护，一般两年生的小苗均长到25-35cm高度，比不上遮阳网二年生苗长高出一倍。

追页面肥：到6月下旬，按时喷雾消毒时可利用掺叶面肥进行根外追肥。一般三周追施一次即可，叶面肥要用叶面宝或多元磷酸二氢钾，中途可用920(赤霉素)单独喷施一次，浓度可按说明书配置即可(常用量为1g100ppm兑水20kg叶面喷雾)。

停止消毒：到9月中旬小苗基本木质化时，可停止消毒。

浇水：出苗前不宜浇水，待种苗出齐后在久旱不雨或夏季高温要及时浇水，下雨或遇旱洒水后要进行松土保墒、防止土壤板结。在苗木生长初期，为防止日灼危害，采取少浇勤浇水，以利降低地表温度。除

在施肥、打药、喷洒除草剂时需要浇水外，一般保持表土适度湿润，不宜浇水过多，土壤过湿或圃地积水，易发生松苗立枯病。速生期遇特殊干旱天气，应适时灌溉2—3次抗旱水，而且要浇足浇透，以利于促进苗木迅速生长。

除草：撒播苗拔草后要适当覆土，以防裂缝。条播苗除草和松土结合进行，间苗和补苗同时并举，除草要掌握除早、除小、除净的原则，株间除草用手拔，以防伤害幼苗。

苗期要及时除草，白皮松育苗地可采取化学药剂除草，一般在当出苗后、苗期再喷洒一次50%捕草净0.2—0.3克(每平方米)，可全部消灭育苗地杂草，对苗木安全无害。(也可每亩使用扑草净125克加25%的可湿性除草醚250克兑水25kg，用喷雾器洒在垄面行间上除草。)

施肥：适期适量追肥，促进苗木生长，增强苗木抗性，从5月下旬幼苗开始长出侧根后进行追肥，每10米苗床可追施硫酸铵100克，每隔半月追施1次，全年追施氮肥2—3次，每亩施硫酸铵10—15千克。追肥时将硫酸铵稀释成1%水溶液喷洒，追肥后及时浇水、冲洗净茎叶，以免烧伤幼苗，有利于苗木充分吸收。最后一次追施过磷酸钙，以促进苗木充分木质化，增强抗性。

(小苗出土三个月后，即六月中旬，可施一次淡液肥，液肥配制，氮、磷、钾或有机质总含量不能超过0.2%，或用烘干鸡粪肥(已杀虫处理过的)，直接施入行距之间，以30m长行距为例，每行施鸡粪肥不超过2000克为限，到8月下旬在施入一次上述肥料，小苗就可以安全过冬了)。

(可在5、6月份适当增施N肥，7月份施用P、K肥，以后停止施肥，促进苗木充分木质化)

(幼苗宜适当密生，间苗不宜太早，以6月至7月间生长旺盛期为适宜。间苗后需浇水一次，并结合追肥，每亩可用磷酸二铵10斤至15斤。白皮松幼苗生长较慢，故苗期应及时清除杂草。为了减少水分的蒸发和增加土壤的透气性，雨后和灌水后应及时松土中耕，其深度逐次先浅渐深)

(白皮松幼苗应以基肥为主，追肥为辅。从5月中旬到7月底的生长旺期进行2至3次追肥，以氮肥为主，追施腐熟的人粪尿或猪粪尿每亩3担，加水20担左右，腐熟饼肥每亩5至15公斤对成饼肥水15担左右，每亩施尿素4公斤左右。生长后期停施氮肥，增施磷、钾肥，以促进苗木木质化，还可用0.3%至0.5%磷酸二氢钾溶液喷洒叶面)

(白皮松幼苗应以基肥为主，追肥为辅。从5月中旬至7月底的生长量旺期追肥2~3次，以硫铵、硝氨等氮素肥料为主，每次亩施7~10kg，每月一次，施后充分灌水，防止烧苗。生长后期停施氮肥，增施磷、钾肥，以促进苗木木质化。还可用0.3~0.5%磷酸二氢钾溶液喷洒叶面。秋后适当控制水肥，雨后及时排涝，防止土壤过湿，发生病害)

(白皮松施肥要从幼苗开始，幼苗应以基肥为主，追肥为辅。3-4月第一次施肥，从5月中旬到7月底的生长旺期进行2至3次追肥，以氮肥为主，追施腐熟的人粪尿或猪粪尿每亩3担，加水20担左右，腐熟饼肥每亩5至15公斤对成饼肥水15担左右，每亩施尿素4公斤左右。生长后期停施氮肥，增施磷、钾肥，以促进苗木木质化，还可用0.3%至0.5%磷酸二氢钾溶液喷洒叶面)。

防寒：入冬前要埋土或覆草防寒。方法是在结冻前灌一次透水，隔几天表土已干燥，用碎细的表土盖苗，使苗木歪倒一边埋上土，埋土厚度超过苗梢3厘米至5厘米。翌年春季土壤解冻后分次撤土或撤草，并灌一次返青水，以防春旱。

大汉白皮松网：<http://www.91bps.com/>是一家专业的白皮松网络经营平台，在这里，我们能为您提供优质的白皮松小苗、白皮松价格、白皮松报价和绝对第一手的白皮松相关技术与资讯。