香榧苗 香榧苗厂家 香榧苗2+2

产品名称	香榧苗 香榧苗厂家 香榧苗2+2
公司名称	诸暨市森汇香榧合作社
价格	15.00/株
规格参数	
公司地址	绍兴市诸暨市东白湖镇
联系电话	18967559107

产品详情

首先进行林地的选择，通过其对土壤的特性来选，具体介绍如下：

适宜种植在气候温和湿润、夏季凉爽的中低山区，海拔200-800m。年均气温14°C以上，冬季最低气温不低于-15°C，通风向阳的平缓坡地及土壤深厚、肥沃、疏松、排水良好的沙质土壤上。过风山脊、岗顶不宜造林。土壤以沉积的沙壤土、壤土为宜，土层厚度大于50cm，PH值5.0-7.5。

然后就要进行整地挖穴了，方法：冬季全面整地，中缓坡地采用带状整地;陡坡采用块状或者鱼鳞坑整地，定点挖穴，施足底肥。

由于香榧为雌雄异株，以风为媒，所以应在林中和主风的上风口适当栽植雄株树，以利于授粉，一般为雌榧株数的 3%--5%。

挖栽植穴时宜大不宜小，挖穴规格：60-80cm见方，深50cm
。挖穴前需先清理表层枯枝落叶，然后将表层肥沃土和下层土分开堆放，挖好后及时施足腐熟的基肥。

接下来就是育苗的选择，应选择根系发达、生长旺盛、无病虫危害的优质壮苗，在资金允许的条件下最好选择“ 2+5 ”大苗，这样的苗木可以提前进入结果期，见效快。

育苗方式

1、实生苗繁育。在9月上中旬，采集充分成熟的种子(可用细榧或圆榧)，去假种皮后在室外用湿沙与种子层积贮藏进行催芽，到11-12月即有少量种子萌芽，到翌年3月发芽率达80%左右，即可拣出分批播种，培育成实生苗。

2、嫁接苗繁育。实生苗培育1-2年后，于3月中下旬，采用破心接或挖骨皮接法，用良种接穗进行嫁接，成活率可达90%以上，再培育2年后，即苗高达50厘米左右时可定植造林。

第四点就是造林季节和密度的控制

香榧最佳种植时间是10月下旬-12月上旬，其次是春季造林。2月下旬-3月中旬，最好选择雨后栽植。每亩造林20—30株，种植密度一般为4×5米或5×5米。香榧属于浅根性树种，种植时宜浅不宜深。如是香榧营养钵苗，栽植时应去除营养钵。

栽植方法采用“ 一提二踩三埋 ”，做到根舒苗正，下紧上松。嫁接苗需去掉薄膜，然后立杆支撑苗木。覆盖土不可盖过嫁接口，应在嫁接口下1cm处，根部土壤成馒头状。

谨记第五点，就是及时遮荫

香榧幼年喜阴，对高温较为敏感，夏天直射光过强会导致枝叶发黄、生长不良现象，遮荫可降温并防止强日照，以减少苗木水分消耗，这是高温干旱地区提高香榧造林成活率的关键措施。

小苗造林后1—3年都要遮荫，一般用竹片围苗，上覆遮阳纱，但不能用遮阳纱包围苗木，否则侧方散射光不足，苗木同样生长不良。农户小规模造林用松枝插于向阳面也可起到遮荫效果。

香榧在整个幼年期都要求有一定的侧方庇荫，因此，带状整地或块状整地的要尽量保留带两侧或块周围的植被，以形成侧方庇荫，不仅提高造林成活率，而且有利于水土保持。

之后就是对栽培后进行呵护管理了

种植后需做好松土、除草、施肥工作。造林后头几年，林地可以合理套种农作物，以耕代抚。应该注意的是：一是作畦套种的香榧应在畦中间。

农作物应离香榧苗50厘米以上，不要损伤树苗及根系;二是在山湾及容易积水的地方要开好排水沟;三是施肥要在种活后，特别是化肥，需在离树苗30厘米以外的地方施用。香榧种植后头几年每年除草松土2—3次、施肥2—3次，施肥以土杂有机肥为主，开沟深施。

以后随榧树一年年长大，逐渐增加施肥量，并增施磷钾肥。冬季深翻和冬肥。12月—翌年1月，把香榧树周围深翻一次，能改善土壤通气条件，促进幼树生长。结合土壤深翻时施入足量基肥，以有机肥为主。

春肥和第一次除草松土：一般在3月—5月，以施速效肥为主，要求少量多次，以避免肥伤，目的是促进其生长，具体用量根据长势与树形大小而定。秋肥和第二次除草松土：一般在9月份，施肥方法和春肥一致。