中国孵化机配件,导电表中国孵化机配件

产品名称	中国孵化机配件,导电表 中国孵化机配件
公司名称	蚌埠市福宝孵化设备有限公司
价格	980.00/套
规格参数	适用对象:鸡、鸭、鹅、蜂、鸽、鹌鹑、其他 用途:中国孵化机配件 品牌:福宝`通宝
公司地址	安徽省蚌埠市友谊路8号
联系电话	86-05524089696 13909626199

产品详情

适用对象 鸡、鸭、鹅、蜂、鸽、鹌 用途 中国孵化机配件

鹑、其他

品牌 福宝`通宝 型号 12096

产品规格 12096 外型尺寸 337*246*263

包装说明组合包装控温范围0-39.9类型中国孵化机配件产品类型全新

胚胎发育图解禽	还发育照蛋图鸭蛋的孵化技术鹅蛋的孵化技术鸵鸟孵化技术环流出雏机	
	胚胎发育图解	1
	末受精蛋种蛋中通常被称为"卵黄"的部分,实际上只是一个细胞,即雌性,细胞核和大部分细胞质集中为一个不规则的小白点,浮于卵黄上面和卵黄 化但不能发育,称未受精蛋。	
未受精蛋		
	→ 受精蛋鸡的卵子在输卵管的漏斗部与精子相遇而受精,受精卵在母体内滞留	期间オ

一团细胞,此时为胚胎发育的囊胚期。从正面看囊胚像覆盖在卵黄表面的圆盘,中身

受精蛋	
文件虫	
	第一天: 受精卵经过24小时的孵育,胚盘变大变厚,明区和暗区同时增大,在卵黄 见到椭圆形的盾称为胚盾,是未来的胚区。
第一胚龄照蛋	
	第二天:胚盘已扩展一倍并被红色的血管围成樱桃形或椭圆形,这些血管即胚胎的9
** — II II A DZI TZ	囊循环的边缘血管缘窦。胚盘中心有一变曲的透明体胚胎,透明体中可见一抹着的小红点,即原始心脏。
第二胚龄照蛋	
	第三天:由孵化的第一天开始,蛋白中的水分通过半透性卵黄膜向卵黄中移动,使卵中水分含量大增,新进来的水分并不与卵黄液全仙融合而主要存在于胚区。胚胎与的卵黄囊血管形似蚊子,白壳种蛋通过照视可见蚊状的血管区,俗称"蚊虫珠"。
第三胚龄照蛋	
	第四天:卵黄体积继续增大,颜色变淡,卵黄囊血管包围卵黄近1/3,由于卵黄液化制的压力,使卵黄囊血管紧贴于内壳膜,可与外界进行气体交换。照蛋时卵黄不易转动胚与卵黄囊血管形似蜘蛛,俗称"小蜘蛛"。尿囊是一个很小的水泡,眼睛开始沉和色素。

第四胚龄照蛋	
为四四级元虫	
	第五天:胚胎被包围在一个透明的水泡(羊膜)中,羊膜内充满羊水,胚体奪曲, 黑色素大量沉积。卵黄囊已包围1/2的卵黄,照蛋时可见到眼睛的影子,俗称"单珠 "黑眼"。肉眼已可见到尿囊,直径6毫米左右。
	第六天:尿囊增长迅速,一天之内增长了约4倍,尿囊血管系统迅速发育,已经覆盖:
第六胚龄照蛋	第八天: 冰葉唱长迅速,一天之內唱长了约4倍,冰葉皿官系统迅速发育,已经復本与部分卵黄,但较卵黄囊血管细;卵黄囊血管分布在卵黄面积达2/3以上。胚体已初身和腿的外型,已眼睛黑色素更多,照蛋可见头部与躯干部两个小圆团,俗称"双珠"
第八座 树思虫	
谷上版收码定	第七天:卵黄体积达到最大程度,以后将逐渐缩小,卵黄囊虽然也增大,仍有1/4 卯 被覆盖;尿囊比第6天增长约两倍;胎儿的外形已具备禽类的特点,头和眼所占的比似 当大,前后肢分化明显,胎儿的透明度开始降低,胚胎半沉半浮横卧于羊水中。
第七胚龄照蛋 	
	第八天:尿囊较第7天扩大了一倍,几乎包围了卵黄囊。从第4天到第8天是尿囊发育的

	一阶段,胚胎由卵黄囊呼吸转化为尿囊呼吸。胎儿外形发育趋于完善,上喙由色,强齿明显可见,胸腹腔尚未封闭,心、肝、胃都暴露于体腔外。羊水与尿囊液迅速增强
第八胚龄照蛋	第九天:尿囊沿内膜迅速向下端发展,包围了胎儿和卵黄,并包围部分蛋分由。胎 肤透明度下降,皮肤表面出现排列整齐的小点,即羽毛原基。胸腹腔已封闭,心、原
第九胚龄照蛋	胃等器官已包入体腔。
为 / III Line A /	第十天:尿囊在胚胎的背面迅速向下端发展,将蛋白逐渐包围起来。当孵化的第10束时,尿囊虽向小端逐渐包围,但尚未合拢。公路儿皮肤的羽毛原基遍及全身,翼和部羽毛的尖端已微露。胎儿的位置靠近气室。

第十胚龄照蛋		
	第十一天:由于尿囊完全包围了卵黄、胚体和蛋白、尿囊血管已在小端吻合,」 化后的第10天零半天,照蛋检验将这一现象称为"合拢"。从第8天到第11天是 的第二阶段。尿囊的合拢与否意义重大,只有合拢完善,才能保证胎儿吞食?	尿囊.
第十一胚龄照蛋		
	第十二天:图中尿囊在蛋白端尚有一小孔未合拢,对于12天的胚胎发育似乎嫌怕 个体差异,这种情形并不罕见,鸡胚短羽已遍与爪已角质化。蛋白呈淡黄褐色 浆羊膜道形成。	
第十二胚龄照蛋	·	
	第十三天:将羊膜道是输送蛋白至浆羊膜腔的细长通道。粘稠的蛋白由于尿囊的收缩,像挤牙膏一样不断进入将羊膜腔,与羊水混合,这种含有蛋白的羊水,养羊水,胎儿开始大量吞食蛋白羊水。 胎儿在孵化的第12天至第18天期间,除了摄取营养外,靠吞食蛋白羊水由消化道摄取营养也是重要途径。由于蛋白中各种	称为3
	含量平衡,使胎儿的重量迅速增加,由第12天的5克左右增至第18天的22克左	
第十三胚龄照蛋		
	第十四天:尿囊血管充分发育并紧贴壳膜,通过内外壳膜、蛋壳排出二氧化碳,吸进氧气;尿囊液增加,主要集中于羊膜周围,新陈代谢旺盛,胎儿增重迅度 胚蛋时尿囊血管很容易破裂。 胎儿大量吞食蛋白,为增重和羽毛的生长提供了部羽毛长度达10毫米。传经验认为,此日前后为养毛期,孵化温度应平稳,以仅	速。 营养
	正常吞食消化蛋白。	

第十四胚龄照蛋		
	第十五天:尿囊所包围的蛋白减少,照视胚蛋,小端发亮部位缩小,胚体与卵部分增多。 胎儿的羽毛生长迅速,颈部羽毛长度达12毫米,身体各部羽毛生长、	
第十五胚龄照蛋		
ΔΔ. 1. 3. Π.Τ. ΙΑ. Π.Τ. Τ.Ζ.	第十六天:尿囊所包围的蛋白进一小减少,尿囊液颜色变混,有少量尿酸盐积 白、胚胎代谢产物增多,排泄的尿酸盐贮存在尿囊中。胎儿体重继续增大,羽 丰,颈部羽毛长度达15毫米。	
第十六胚龄照蛋		
	第十七天:这是煮熟的全胚,已剥去尿囊。孵化到17天,蛋白基本上向羊膜腔,胎儿仍被蛋白的羊水包围。小图中为胎儿的新鲜肌胃,可见到胃内的乳凝块明的蛋白羊水,被吞食到胃中受到胃酸和消化酶的作用而变成乳凝块。 胎儿由和卵黄中摄取了全价蛋白体重增加,外形和羽毛的发育,与出壳的雏鸡差异不比的第12天至17天是尿囊发育的第三阶段,尿囊的合拢导致胎儿可以完全吞食。	,本 于从 大。 <i>b</i>

第十七胚龄照蛋	
	第十八天: 残存的蛋白羊水被吞食完毕,尿囊液减少,气室增大,尿囊增厚并收缩个胚胎较易与蛋壳膜剥离,可见到两面三处尿酸盐沉淀。 由于蛋白利用较好,胎儿毛像缎子一样覆盖在鸡体表面。此后胎儿的营养来源只有一种卵黄。
第十八胚龄照蛋	第十九天:气室继续扩大,尿囊液与羊水继续减少,快活酸盐沉积增加,尿囊血管
	,表明尿囊仍司呼吸器官的职能。孵化第19天在气室中可见展翅,少数雏鸡的喙已内壳膜而达于气室。可听到雏鸡的鸣叫声。 雏鸡的营养全靠卵黄,部分卵黄已收力,一旦雏鸡的喙的喙进入气入气室,即开始肺的呼吸,此时雏鸡尿囊和肺的呼吸并并逐渐由前者过渡到后者。呼吸量大,代谢热产量大增,通常在这一天"落盘"
第十九胚龄照蛋	·
	第二十天:孵化的第20天是最关键的一天。雏鸡由囊呼吸守渡到肺呼吸,剩余部分收入腹腔,雏鸡蓄积力量,准备出壳。大量啄壳应在第20天初。雏鸡的喙已穿破气然后用破壳齿划破外壳膜,再用喙向外顶,使蛋壳破裂。 蛋壳被啄破,雏鸡可直挤界呼吸,此时尿囊膜开始枯萎,但仍有血管在工作。卵黄大部分收入腹腔,只有少露在腹外。破壳后,经过数小时的发育,雏鸡继续移动着头部,不断破坏外壳膜,上形成一个环状缺口。
第二十胚龄照蛋	
	 第二十一天: 蛋壳被啄破,雏鸡可直接由外界呼吸,此时尿囊膜开始枯萎, 但 仍有

在工作。卵黄大部分收入腹腔,只有少部分露在腹外。破壳后,经过数小时的发育。 鸡继续移动着头部,不断破坏外壳膜,在蛋上形成一个环状缺口。 蛋壳被啄破,雏鸡直接由外界呼吸,此时尿囊膜开始枯萎,但仍有血管在工作。卵黄大部分收入腹腔 有少部分露在腹外。破壳后,经过数小时的发育,雏鸡继续移动着头部,不断破坏外膜,在蛋上形成一个环状缺口。

第二十一胚龄外观

第二十一天: 在第20天后期,已有雏鸡破壳而出,大批出雏在第21天的上半天。由啄壳到出壳是胚胎发育不可 鸡在出壳过程中使呼吸、循环和运动系统得到加强,促进了卵黄的吸收和脐部的收缩。

出雏:刚破壳而出的雏鸡全身被羊水浸湿,行动无力,在出雏器良好环境中羽毛干燥膨松,行动积极,鸣叫有良种蛋受精率在98%以上,受精蛋孵化率也在99%以上。"通宝"牌系列孵化设备,温度、湿度、通风、转蛋全 靠,为国内大、中、小型养鸡(禽)企业广泛采用