

普旺兽药10%恩诺沙星可溶性粉

产品名称	普旺兽药10%恩诺沙星可溶性粉
公司名称	河南普旺生物工程有限公司
价格	200.00/桶
规格参数	品牌:普旺生物 1000g:1桶
公司地址	河南省新乡市原阳县平原示范区桥北乡 马井村
联系电话	0373-7595628 13643718607

产品详情

【主要成分】恩诺沙星

【性状】本品为白色或淡黄色粉末。

【药理作用】药效学恩诺沙星属于动物专用的杀菌性广谱抗菌药物，对大肠埃希菌、沙门菌、克雷伯氏杆菌、布鲁氏菌、巴氏杆菌、胸膜肺炎放线杆菌、丹毒杆菌、形杆菌、黏质沙雷氏菌、化脓性棒状杆菌、败血波特氏菌、金黄色葡萄球菌支原体、衣原体等均有良好作用，对绿脓杆菌、链球菌作用较弱，对厌氧菌用微弱。对敏感菌有明显的抗菌后效应。本类药物的抗菌机制是作用于细菌胞的DNA旋转酶（II型拓扑异构酶），干扰细菌DNA的复制、转录和修复组，细菌不能正常生长繁殖死亡。其作用有明显的浓度依赖性，血药浓度大8倍MIC时可发挥最佳治疗效果。

药动学大多数单胃动物内服本品能很好吸收，0.5~2小时血药浓度达高峰，内食物可延迟药物吸收速率，但不影响吸收数量。鸡内服的生物利用度为62~84%。本品在动物体内广泛分布，能很好进入组织、体液（包括骨骼和前列腺除了脑脊液的浓度只有血清浓度的6%~10%外，几乎所有组织的药物浓度均高血浆，能在白细胞蓄积达血浆浓度的140倍。肝脏代谢主要是脱去7-位哌嗪的乙基生成环丙沙星，其次为氧化及葡萄糖醛酸结合。消除主要通过肾脏(E小管分泌和肾小球滤过)排泄，15%~50%以原形从尿中排泄。鸡内服半衰为9.1~14.2小时。

【药物相互作用】 与氨基糖苷类、广谱青霉素合用有协同作用。

Ca²⁺、Mg²⁺、Fe³⁺、Al³⁺等重金属离子与本品可发生螯合，影响吸收

与茶碱、咖啡因合用可使后者的代谢抑制，血中茶碱、咖啡因的浓度异常高，甚至出现茶碱中毒症状。

有抑制肝药酶作用，与在肝脏中代谢的药物合用，可使其清除率降低，浓度升高。

丙磺舒可抑制其肾小管分泌排泄，使其半衰期延长。

【作用与用途】 氟喹诺酮类抗菌药。用于禽细菌性疾病和支原体感染。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每1L水，鸡0.25~0.75g。一日2次，连用3~5日。

【不良反应】 (1)可使幼龄动物软骨发生变形，引起跛行及疼痛。

(2)消化系统反应有呕吐、腹痛、腹胀。

(3)皮肤反应有红斑、瘙痒、荨麻疹及光敏反应等。

联系热线：13643718607

QQ咨询：2633624387

普旺网址：<http://www.pw1999.com>