

# 农夫稼园地火消毒液、优质杀菌剂地火供应商

产品名称	农夫稼园地火消毒液、优质杀菌剂地火供应商
公司名称	河南农夫稼园生物技术有限公司
价格	128.00/桶
规格参数	品牌:农夫稼园 型号:桶装
公司地址	河南郑州市西三环大学科技园（东区）
联系电话	037156762198 13353715258

## 产品详情

地火给大自然一片洁净的土壤

本品是具有熏蒸作用的氨钾酸酯类土壤消毒产品

，其在土壤中降解成“异氰酸酯”发挥熏蒸作用，通过抑制生物细胞分裂和DNA、RNA和蛋白质的合成以及造成生物呼吸受阻，能有效预防和消除根结线虫、真菌、细菌、病毒及部分杂草等有害生物，从而获得洁净及健康的土壤。地火-适用范围及防止对象

适用于温室、大棚、塑料拱棚、花卉、烟草、中草药、生姜、山药等经济作物苗

床土壤、重茬种植的土壤灭菌，及组培种苗等培养基质、盆景土壤、食用菌菇床土等熏蒸灭菌。

地火-使用方法 在作物移栽或播种前20-25天左右开始使用，每亩使用本品20-40公斤，施用后保持土壤湿度在65%~75%之间，土壤温度10 以上，施用均匀，地火在土壤中深度达15~20cm，施用后立即覆盖塑料薄膜并封闭严密，防止漏气，密闭15天以上。

一、苗床使用方法：

1.整地：施用前先将土壤耕松，整平，并保持潮湿。 2.施用：按制剂用药量加水稀释50-75倍（视土壤湿度情况而定）稀释，均匀喷到苗床表面并让药液润透土层4厘米。

3.覆盖：施用后立即覆盖聚乙烯地膜阻止药气泄漏。

4.除膜：施用后10天后除去地膜，耙松土壤，使残留气体充分挥发5~7天。

5.播种：待土壤残余气体散尽后，土壤即可播种或种植。 二、营养土使用方法：

1.准备营养土：如使用有机肥、基肥等需先与土壤混合均匀。

2.配制稀释液：将本剂加水稀释80倍液备用。

3.施用：将营养土均匀平铺于薄膜或水泥

地面5厘米厚，将配制后的液体均匀喷洒到营养土上，润透3厘米以上，再覆5厘米营养土、喷洒配制后的液体，依此重复成堆，最后用薄膜覆盖严密，防止气体挥发。

4.除膜：施用后10天后除去薄膜，翻松营养土，使剩余气体充分散出，5天后再翻松一次，即可使用。

三、保护地及陆地使用方法： 1、施用前准备工作

清园：清除田间作物植株及残体（包括杂草等根茎叶）。

补水：根据土壤墒情，适当浇水使土壤湿度达到65%~75%。 施肥：为避免有机肥带有病菌

，有机肥等需要在施用前均匀施到田间。“活体”菌肥应在施用本品后使用。

翻耕：施用前耕松土壤。 3、施用方式 沟施：在翻耕后的田地上开沟，沟深15~2

0cm，沟距20~25cm，制剂按亩用量适量对水（一般80倍左右，现用现对），均匀施到沟内，施用后立即覆土、覆盖塑料薄膜，防止气体挥发。

**注射施用：使用注射器械**

在田间均匀施用（根据器械情况和土壤湿度适量对水），间距20~25cm × 20~25cm，施用后封闭穴孔，覆盖塑料薄膜，防止气体挥发。

**滴灌施用：滴灌施用需适量加大用药量及水量，以期达到施用要求。** 4、散气：施用后密闭熏蒸时间随气温变化，气温在20 ~25 密闭15天以上，气温在25 ~30 密闭10天以上。撤去薄膜后当日或隔日深翻田土，使土壤疏松，散气

5~7天。检测散气效果可做白菜

种子发芽试验，观察白菜出苗及根的健康情况判断气体散尽与否。确定气体散净后即可播种或移栽。

**注意事项** 1.本品不可直接施用于作物表面，土壤处理每季最多施用1次。

2.地温10 以上时使用效果良好，地温低时熏蒸时间需延长。 3.本品应于0 以上存放，温度低于0 易析出结晶，使用前如发现结晶，可置于温暖处升温并摇晃至全溶即可，不影响使用效果；本剂使用时需要现配现用，稀释液不可长期留存；本剂不能与波尔多液、石硫合剂等混用。

4.施药时应穿长衣长裤、戴手套、眼镜、戴口罩

等，禁止吸烟、饮食等，施用后清洗手、脸等暴露部位。

5.远离水产养殖区、河塘等水域施药，禁止在河塘等水域中清洗施药器具。

6.避免孕妇及哺乳期的妇女接触本品。

7.用过的容器应妥善处理，不可做它用，也不可随意丢弃。 **中毒急救**

1.皮肤接触：立即脱掉被污染的衣物，用肥皂和大量清水彻底清洗受污染的皮肤至少15分钟。

2.眼睛溅液：应立即翻开眼睑，用清水冲洗10-15分钟，再请医生诊治。

3.一般中毒：应立即离开施药现场，心脏活动减弱时可用浓茶、浓咖啡暖和身体，并送医院对症看病。

4.误服：应立即催吐，使用1%-3%单宁溶液洗胃，严重时，携此标签送病人到医院诊治。

**储运方法** 应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。

置于儿童触及不到之处，并加锁。 勿与食品、饮料、 饲料等其他商品同贮同运

联系电话：13353715258，欢迎您的来电咨询！