

重庆自生源土鸡苗供应土鸡养殖技术提供！

产品名称	重庆自生源土鸡苗供应土鸡养殖技术提供！
公司名称	梁平县惠民家禽养殖专业合作社
价格	3.50/只
规格参数	品牌:久俊农业 型号:青脚红羽土3 小青脚3号:2480KG
公司地址	重庆市梁平区双桂街道红桂路隆鑫B区2-223
联系电话	15723553855

产品详情

啄肛癖是一种禽类的条件反射，指蛋鸡啄食肛门及其肛门下的腹部，多见于高产笼养鸡群或新开产鸡群。诱发原因主要是初产母鸡受激素的影响，性情敏感，好斗、好啄，产出过大的蛋时努责时间长，造成肛或肛门撕裂，产蛋后不能及时收缩回去而留露在外，造成互相啄肛；也发生于腹泻的蛋鸡，诱因是肛门带腥臭粪便。鸡癖一旦发生啄肛，便互相模仿，易引起群发，造成重大经济损失，且具成瘾性，治愈特别困难，所以啄癖防治的关键在于防，防重于治，在饲养过程中应切实做好日常饲养管理工作，以杜绝啄肛的发生。

一、啄肛发生的原因1.鸡只不断啄或断啄轻

，而又没有及时再次进得断啄是本疫病的重要原因

。2.饲料成分单一

，长期使用低档饲料，其微量元素、维生素不平衡或含量不足，或突然改变饲料而诱发。粒型颗粒料比粉料更易引起鸡的啄癖，所以蛋鸡料宜做成粉料；在饲料中使用动物或植物油进行催肥时，往往会有油变质现象，变质的油没有刺激性气味，鸡吃食可能从肛门流下恶臭液体，气味刺激，鸡肛门有不舒服感觉，因此鸡本身会自己啄肛，啄破的肛门更会有其它鸡啄；同时饲料中粗蛋白高，能量偏低，也是导致啄肛的又一重要因素。3.

鸡舍简单，通风不良，温度过高，地面潮湿，密度过大，光照过强或者饮水供给不足，转群分群造成应激，极易引起鸡啄癖发生。4.当

群发生白痢、球虫病时易引起啄癖，疫病因素体外寄生虫较多，没有及时驱虫，其他继发性疫病没有得到及时的治疗；多种原因引发输卵管炎，产道肿胀，导致难产，使泄殖腔外翻时间过长，其它鸡看到高度充血的泄殖腔就

啄；疫病预防工作未跟上，清洁卫生

较差，是引起啄癖的诱因。

二、啄肛癖的预防措施啄肛癖目前没有特别有效的药物可以根治，只有加强饲养管理，供给营养均衡的饲料，搞好鸡舍清洁、卫生。

(一) 适时适度断喙及时合理地断喙，一般6--9日龄诊断，70

日龄再次断喙，上笼开产前发现个别鸡喙过长时可再次补断，可采取喷灯断喙法、铁炉断喙法或用断喙器断喙，要求为鸡上喙断去鼻孔至喙尖的1/2，下喙断去1/3

，在断喙前后一天在饮水中加入维生素K3

和红霉素，混均后让鸡自由饮水，防止断喙时出血和感染。(二) 选用优质，营养均衡的饲料及时调整饲料配方：1L鸡全价料、30%玉米粉、30%

米糠，并添加增肥速效散，同时早晚各添喂一次青草，菜叶等青饲料。(三) 改善鸡舍环境控制饲养密度，一般养鸡场每群以200--300

只为宜。加强通风换气，产蛋鸡的适宜温度在15—20度，相对湿度55%--65%

，饲喂定时、定量

、定人，减少外界因素干扰。

鸡舍光照时间和强度不可过度，以每平方米3

瓦白炽灯的照亮度为上限，对已有啄癖的鸡只，舍内采用红色光照或将光线调暗，亦可减轻蛋鸡啄肛。

四) 防病治病做好疫病的预防和治疗，可有效地降低鸡癖肛的发生，常用的方法是，定期投饲预防和治疗球虫病(畅球消)、白痢(箭沙速宁

)、大肠杆菌性肠炎引起输卵管炎的药物(义合杆威)

，防止疫病的发生。已发生啄癖的就要采取紧急措施进行防治工作，对已被啄破流血的地方，要涂抹颜色较暗而带有气味的药物，如紫药水、臭药水或鱼石脂等。对已被啄伤的鸡，要及时从群中取出，分开饲养，等伤口愈合后再放入鸡群。采用药物治