

河北苗圃北美海棠园林绿化庭院树

产品名称	河北苗圃北美海棠园林绿化庭院树
公司名称	河北源林诚宇园林绿化工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市临城县经济开发区临城大道69号
联系电话	0311-83018761

产品详情

海棠家族的新宠——北美海棠

形态特征

美国海棠为落叶小乔木，株高一般在2.5-5米，树型上由开展型到紧凑型、垂枝型；分枝多变，互生直立悬垂等无弯曲枝。树干颜色为新干棕红色，黄绿色，老干灰棕色，有光泽，观赏性高。叶色上由绿色到红色、紫色或先红后绿，可谓色彩斑斓；花型上由过去的野生种单瓣浅色变为深色、多色、重瓣，色彩绚丽，花量之大，令人叹为观止。谢花后珍珠般果实挂在枝头，有的可至雪降，极具观赏价值。

叶片长椭圆形或椭圆形，长5-10厘米，宽2.5-5厘米，先端急尖或渐尖，基部楔形稀近圆形，边缘有尖锐锯齿，嫩叶被短柔毛，下面较密，老时脱落；叶柄长2-3.5厘米；托叶膜质，线状披针形，先端渐尖，边缘有疏生腺齿，近于无毛，早落。新叶色绿、在6月慢慢成长呈五颜六色，渐转紫红。叶脉网状。

花序分伞状或着伞房花序的总状花序，多有香气。有花4-7朵，集生于小枝顶端，花梗长2-3厘米，嫩时被长柔毛，逐渐脱落；苞片膜质，线状披针形，早落；花直径约4厘米；带有脱落型或着不脱落型的花萼，萼筒外面密被白色长绒毛；萼片三角卵形，三角披针形至长卵形，先端急尖或渐尖，全缘，长5-8毫米，内面被白色绒毛，外面较稀疏，萼片与萼筒等长或稍长；花瓣近圆形或长椭圆形，长约1.5厘米，基部有短爪，花朵基部合生，花色分白色、黄色、粉色、红色、紫红、桃红等，雄蕊约20，花丝长短不等，比花瓣稍短；花柱5，基部具绒毛，约与雄蕊等长。美国海棠开花早在四月。

肉质梨果，果有绿色、紫红、桃红等，果实直径为0.9-2.5厘米，观果期长达2-5个月，果期8-9月。

海棠花多为较暖的热烈色调，多数红色系海棠的花色从幽深的浓酒红色花蕾随之开放出盛花期明亮的雪青紫、鲜红及冷暖粉红色，盛花过后的颜色日渐清淡，正好被新萌发的叶色衬托，别有一番景观。当使用海棠树数量比较多时，配置少量的白花品种是非常必要的，白花及其绿叶会起到明亮色彩的效果，使其它的颜色明快起来。是一种罕见的集花草，植物，水果作为观赏树种。

观赏价值

美国海棠的观赏价值很高，花色、叶色、果色和枝条色彩丰富，加之其不同季节中花、叶、果、枝和多姿的形态所突显出来的景观使观赏期整年持续，果实观赏期大多在半年以上，春季可观花，秋季可观果，而且美国海棠适应性强，在中国北方气候条件下易存活。

美国海棠夏季结果，果较小，颜色呈紫红色，人不能食用，但花和果均可观赏。美国海棠结的果，可说是硕果累累，很有欣赏价值，但食用味道并不鲜美可口。

生长习性

美国海棠抗性强、耐极薄，耐寒性强，性喜阳光，耐干旱，忌渍水，在干燥地带生长良好，管理容易。深秋以后气温逐渐下降，垂丝海棠的生长也受到抑制。以后进入半休眠状态，新枝嫩叶不发，花朵稀少。中国北方一二月气温低，有时连续严寒冰冻。美国海棠家庭莳养若不注意保暖，便有冻死的可能。故霜冻之前要把盆株移置室内有阳光的地方。

5月是美国海棠鲜叶最具魅力的时间，初叶颜色日渐鲜艳，而新发的叶梢比起4月的首批新叶更加鲜亮美丽。阳光穿透的彩色叶片莹润柔和，并不亚于花的靓丽，新叶彩色的观赏期在植株生长季节不断出现。如“喜洋洋”挂有粉霜的红艳、“李斯特”葡萄酒般的透红、“霹雳贝贝”飘洒的紫红色等，与翠绿的“春雪”、浓绿的“亚当”及墨绿的“红巴伦”为伴，显得更加妩媚。5月中旬至6月上中旬，美国海棠叶片的表现十分突出。

7至8月由于高温，多数海棠不再抽发新梢，颜色逐步稳定，可归为绿叶组、红叶组和红绿叶组，每组都有不同色差。如红叶品种中“霹雳贝贝”比“王族”更明亮；绿色品种中“当娜”比“春雪”更浓重；绿里透红中“粉屋顶”深绿透着棕红，而“李斯特”则是橄榄绿透着鲜红。红的程度差异也很大。盛夏是海棠叶色最深的季节，“王族”春季鲜明的红色此时变得沉闷无光，给人黑漆漆的感觉。

部分海棠树的成熟叶在秋季会出现秋色，如“印第安魔力”叶为橘红；“当娜”会出现绿色、橙黄和柠檬黄同树；“丰盛”秋叶紫红转橘红等。海棠被定位为北方树种，适合海棠生长的地区四季分明，秋季出现较大昼夜温差时，不少海棠叶片颜色的变化明显，虽然不会出现红花槭树种的鲜红，但橙红或透金却鲜艳无比。

空气湿度及土壤pH值水平调整着秋叶的浓度和明亮度，雨量充沛时叶色更鲜艳。在庭院使用彩叶海棠，夏季给予充分的灌溉把叶片养肥，秋季不要干旱。

美国海棠落花后果实能够迅速膨大，隐藏于叶片后的时间仅为2至4周。很多品种在幼果时为不同程度的红色，随着季节的不断变化，越长越鲜艳。7至8月是观赏夏果的最佳季节，这时的叶色凝重稳定，将挂满树枝的红透透、黄澄澄的成熟果实衬托出来。能够食用的大果“道格”美艳惊人，香气扑鼻；“喜洋洋”春季鲜嫩的彩色也被翠翠的苹果绿替代，衬托着满树灯笼状洋红的一串串美果，远看像是满树红花；“红玉”的果实经过了6月不起眼的苹果绿、7月的白绿后染上红晕，到夏末时红透透的，像一串串红宝石垂挂在飘逸的柔枝上。“丰盛”、“印第安魔力”、“雪坠”果实颜色差异很大，挂果量大到让人感到不可思议。

海棠果的宿存期，不同品种落果时间差异极大，甚至有长达几个月。在苹果成熟季节会自然成熟后脱落。而宿存期长的多是小果类一般来说，能够食用的大果品种。宿存果分为两类，一是秋冬浆化的果实，虽不会自然落果，但多数将成为鸟类的美味；另一类是坚硬的不浆化果实，冬季可在树上宿存至完全干枯，如“当娜”、“红巴伦”、“亚当”、“红珠宝”，第二年海棠再次开花时还结实地挂在树上。

宿存果的观赏期在湿度大的环境中可持续到来年3至4月。而在冬季空气干燥的环境里，虽然果实挂在树上，但2月刮起的早春干风，会造成其果皮干皱，像晒过的红枣一样，景观效果大打折扣。美国海棠最佳的果实观赏期一般在7月至第二年的1月，挂雪、挂冰的果实最为生动。