

泰安白皮松树苗白皮松平盛苗圃多图

产品名称	泰安白皮松树苗白皮松平盛苗圃多图
公司名称	泰安市泰山区平盛苗圃绿化中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:平盛苗圃 型号:AT1806
公司地址	泰山区省庄镇安家庄(20)
联系电话	13505389748

产品详情

一颗白皮松种子从播种到出芽需要一个月时间，白皮松幼苗生长缓慢，年苗长4厘米-5厘米左右，第二年苗长10厘米左右，第三年苗长20-30厘米。苗木在培育过程中需要进行移栽，小苗移栽到大田，有缓苗过程，大概1年左右。缓苗期白皮松小苗会出现干枯、发黄现象，这属于正常现象。

3年小苗移栽大田长到50公分需要2年时间，长到1米需要3年时间，1.5米需要5年时间。1.5米以上的白皮松每年长40公分左右，长2米6年时间，长到2.5米时，开始缓慢。每年长25公分左右。长到3米需要8年时间。由于白皮松生长比较缓慢，所以造就其价格不断攀升。

白皮松耕种

(一)、种子挑选

白皮松的果实为球果，种子千粒重150~160g。种子应挑选有光泽、丰满，无病虫害，就近收购，并尽量运用头年的优异种子。陈年种子发芽率和出苗率每隔1a大概下降10%~15%，并且非常容易感染病菌。种子选好后，到冬天进行沙藏。

(二)、种子处理

为了避免病虫害，在耕种前要对种子进行催芽及消毒处理。将经过沙藏后的种子除掉杂质和坏了的种子，用0.5%CuSO₄溶液浸种，接连浸泡6~12d即可。在种子消毒期间，天天要充沛拌和4~6次。消毒完成后，用清水冲刷种子1~2遍，然后捞出种子，摊在土地上阴干，不能装在袋子里或摊在水泥地上，也不能被太阳直射，否则会下降出芽率。天天要翻动种子，待种子不粘手开始吐白时，即可耕种。

(三)、耕种

将种、沙按1:3的体积比混合或分层放入坑内，直至离坑沿20厘米摆布时，在上面掩盖间层物和泥土。坑

的中心每隔1米间隔设置1个通气孔，并对坑内温度和湿度经过洒水或掩盖泥土来调理。第二年春天耕种前1天~2天将种子取出，查看发芽情况。催芽程度如未到达请求的，应放在温暖处持续催芽，天天翻动2次~3次，上面盖塑料薄膜，并坚持湿润少数喷水，夜晚掩盖草帘在塑料薄膜上，当有30%的种皮开裂露白时即可耕种。选用点播办法进行白皮松容器袋育苗，耕种1粒~2粒每个容器袋，播后覆土1厘米厚，随即用喷壶喷洒浓度为3%的硫酸亚铁溶液以利于种子发芽。喷药后30分钟，再喷等量清水1次。最后掩盖遮阳网用以坚持床面湿润。

白皮松常见除草剂分类：

1、触杀型除草剂。除草剂药剂在接触杂草的部位发生作用，如喷到叶片，叶枯死，一般很少吸到体内。如除草醚、五氯162酚钠，在使用时常用于喷洒。

2、内吸型除草剂。除草剂药剂被杂草吸收后，在杂草体内传导，然后使整个杂草枯死，如由根部吸收后传导到根、茎、叶。这一类除草剂有西玛津、敌草隆等，对深根性多年生杂草杀伤力很强，能起到杀草除根的效果。

几种常见除草剂：

除草醚：纯品为深褐色固体，熔点70t：~711C，不溶于水，溶于丙酮、二甲苯等有机溶剂中。易被土壤吸附。对人畜低毒，对鱼、虾类中等毒性。出售的有可湿性粉剂与粉剂。有特殊气味，在一般情况下可贮藏2年左右。除草醚属于选择性触杀型。一般在培育松类、杉类、桧柏类树种苗木的圃地使用，它对于防除稗草、牛毛草、寥、马齿苋、灰菜等1年生杂草效果较好。对繁缕及具有走茎的多年生杂草作用很小，对1年生的大草效果也不好。它适宜于播种后在覆土层上使用，药20天左右。杂草幼芽出土时触及药剂后见光便遭毒杀。在气温20X：以上，土壤湿润时杀草效果好。温度低时药效差，应适当增加药量。

西玛津：纯品为白色结晶，熔点225U—2271C，在水中不易溶解，在酸性溶液中加热才能溶解。无腐蚀性。对人畜低毒，无刺激性，药效期在90天以上。出售的有可湿性粉剂。西玛津属于根部内吸型。它对于红松幼苗表现出选择性，对樟松、赤松、云杉、落叶松及许多阔叶树种幼苗都有严重的药害。它防除1年生杂草效果较好。使用时适宜土壤处理，按有效含量计算，苗床上每平方米用量0.5克~1.0克。

阿特拉津（莠去津）：纯品为白色晶体，熔点1731C~175C，能在温水中溶解，在一般情况下不燃烧，不腐蚀，贮放多年药效仍较稳定，对人畜低毒，土壤施用药效期半年，易被土壤微生物分解。出售的商品有可湿性粉剂、颗粒剂。阿特拉津属于根部内吸型选择性除草剂，它的作用、用法和用量与西玛津基本相同，残效期略短，除草作用略大于西玛津。