

冲施肥效果氨基酸冲施肥提高肥效的使用技巧

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 冲施肥效果氨基酸冲施肥提高肥效的使用技巧 |
| 公司名称 | 郑州恒邦农业科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:碧邦 |
| 公司地址 | 郑州市金水区花园北路55号省直花园小区3号楼401室 |
| 联系电话 | 037163223897 |

产品详情

肥料施用要合理，量过大则会造成土壤板结，瓜菜烂根、沤根，植株萎蔫等现象，要想改变上述不良现象，就要注意改良土壤，特别是大棚蔬菜可以依

靠氨基酸冲施肥

的施用来改善土壤的综合形状。氨基酸是从自然界中采集到的固氮解磷解钾活性菌种，经科学配方、组合加工研制而成的一种无公害新型复合生物肥。在施用过程中，必须注意以下五要点：

一是注意棚温、地温和水温。施用氨基酸的最佳温度是25~37℃，低于5℃，高于45℃，施用效果较差。对高温、低温、干旱条件下的农作物田块不宜施用。同时还应掌握固氮菌最适温度，土壤含水量是60~70%左右。

二是不能和其他农药混用，防止活菌致死。注意千万不要与杀菌剂、杀虫剂、除草剂和含硫化肥，如硫酸钾等以及稻草灰混合用，因为这些药、肥很容易杀死生物菌。在施用时，若施氨基酸与防病虫、除草相矛盾时，可先施氨基酸，隔48小时后，再打药除草。若拌种，切忌和已拌好杀菌剂的种子混合使用。同时还应防止与未腐熟的农家肥混用，因为农家肥在腐熟的过程中会发酵，这样会直接杀死生物菌。

三是施用氨基酸要注意田间实际状况。对含硫高的土壤和锈水田，不宜施用生物氨基酸，因为硫能杀死生物菌。对于翻浆的水田，一般不用撒肥，可采用喷雾的方法，效果更明显。

四是因时制宜。氨基酸不是速效肥，所以，要在作物的营养临界期和大量吸收期前7~10天施用效果最佳。同时对不同作物或同一作物的不同时期，要选用不同的施用方法，作物叶背茸毛的多少、叶片蜡质的

厚薄都会影响其使用效果。

联系我们：

电话：15738303990

QQ：3279859766

地址：河南省郑州市金水区花园路55号

官网：www.zzhengbang.com

手机官网：<http://m.zzhengbang.com/>