

# 绿化苗木平盛苗圃泰安绿化苗木基地

产品名称	绿化苗木平盛苗圃泰安绿化苗木基地
公司名称	泰安市泰山区平盛苗圃绿化中心
价格	150.00/件
规格参数	品牌:平盛苗圃 型号:DV1106
公司地址	泰山区省庄镇安家庄(20)
联系电话	13505389748

## 产品详情

从苗木的特性上,绿化苗木大致可分为以下种类:乔灌木、移栽大树、扦插小苗、树桩盆景、竹类植物、藤本植物、草本花卉、草皮草种、造林苗、新优果苗、种籽种苗。

移栽大树分类:红果冬青、桂花、香樟、红枫、杨梅、紫薇、朴树、榔榆、皂角、黄连木、木瓜树等。

扦插小苗分类:金边黄杨扦插小苗、金叶女贞扦插小苗、紫薇扦插小苗、丹桂扦插小苗、红叶石楠扦插小苗、毛杜鹃扦插小苗、红继木扦插小苗、红叶小檗小苗、月季小苗、等

### 苗木假植

大苗在非正常季节种植中,假植是很重要的。这里推荐一种经济适用的假植方法:夏季施工硬容器苗法。此法是提前创造条件在休眠期断根,种植在容器中养护,如木箱、柳竹筐、花盆。在生长季节,也就是施工时,根据容器情况,不脱离或脱容器栽植下地。其特点是:可靠性大,管理简单,可操作性强。

### 大木箱围苗法

针对大规格落叶乔木,如胸径超过500px的银杏,按照施工计划及场地条件,在发芽前进苗。按施工规范要求规格打木箱,木箱规格根据银杏土球直径放大1000px,按此规格制作矩形木箱,然后将银杏植于箱中。选择场地开阔,无其它施工、交通方便的场地,按二列排行,预留巷道。及时灌水,疏枝1/4-1/5,植后木箱苗均正常展叶,在6月15日-7月8日种植。

### 折叠柳筐围苗

针对7-200px的落乔,如臭椿、栾树;1.8--2m的落灌,如丁香和珍珠梅等。于4月13日-4月17日进苗,植于1500px柳筐中,填土踩实,按三行排列及时灌水疏枝。柳筐苗均正常展叶、抽枝。条件具备后,带筐栽植,种植后去柳筐上部二分之一。

## 盆栽苗木

将小叶黄杨、沙地柏、金叶女贞、小檗、锦带等植于750px花盆中。按5-6列排行,预留巷道。盆中基质用原床土加入适量肥料,进行正常的肥、水养护。条件具备时,去掉花盆,苗木土球不散,花盆可再利用。

## 大规格乔木

针对大规格常绿乔木,如6-7m雪松,5-6m油松等,采取大土坨麻包打包,早晚种植及一系列特殊措施。

措施一:夏季高温,容易失水,2000年更高达40度左右,即使应用容器苗工艺。在苗木进场时间问题上,以早、晚为主,雨天加大施工量,在晴天的条件下,每天给新植树木喷水两次,时间适宜在上午9时前、下午4时后,保证植株的蒸腾所需的水分。

措施二:所有移植苗都经过了断根的损伤,即使在进入容器前进行修剪,原有树势已经削弱。为了恢复原来树势,扩大树上树冠,应对伤根恢复以及促根生长采取措施。施生根粉apt3号,浓度1000ppm。施工后,在土坨周围用硬器打洞,洞深为土坨1/3,施后灌水。

措施三:搭建遮阳棚。用毛竹或钢管搭成井字架,在井字架上盖上遮阳网,必须注意网和栽植的树木要保持一定的距离,以便空气流通。

## 药害的原因

### 1、药剂种类选择不当

如波尔多液含铜离子浓度较高,多用于木本植物,草本绿化苗木由于组织幼嫩,易产生药害。石硫合剂防治白粉病效果颇佳,但由于其具有腐蚀性 & 强碱性,用于香樟树等草本绿化苗木时易产生药害。

### 2、部分绿化苗木对某些农药品种过敏

有些绿化苗木性质特殊,即使在正常使用情况下,也易产生药害。如三色栎树、大叶女贞、樱花等对DD畏敏感,桃、梅类对乐果敏感,桃、李类对波尔多液敏感等。

### 3、在绿化苗木敏感期用药

各种绿化苗木的开花期是对农药最敏感的时期之一,用药要慎重。

### 4、高温、雾重及相对湿度较高时易产生药害

温度高时,香樟树苗木吸收药剂及蒸腾较快,使药剂很快在叶尖、叶缘集中过多而产生药害;雾重、湿度大时,药滴分布不均匀也易出现药害。

### 5、浓度过高、用量过大

为克服病虫害之抗性等原因而随意加大浓度、用量,易产生药害,是很多香樟树等苗木产生损害的重要原因之一。