

泰安绿化苗木基地_绿化苗木_平盛苗圃多图

产品名称	泰安绿化苗木基地_绿化苗木_平盛苗圃多图
公司名称	泰安市泰山区平盛苗圃绿化中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:平盛苗圃 型号:YO1211
公司地址	泰山区省庄镇安家庄(20)
联系电话	13505389748

产品详情

一般来说,营造两种以上的混栽林,可改善土壤条件,提高防护效果,但是混栽不当,不但树种间相互抑制生长,而且病虫害发生严重,给生产造成不应有的损失。下面就举出几种不宜混栽的组合:

一、苦楝与桑树混栽苦楝树体内普遍存在一种叫楝素的有毒物质,它对昆虫有较大拒食内吸、抑制发育和杀灭作用,对蚕同样有毒性,它的花毒性更大,如果落于桑园内,有毒物质挥发熏蒸后,采叶饲蚕即会发生急性中毒。

二、橘树与桑树混栽橘叶的汁液是多种成分组成的混合物,其中主要有芳香油、单宁及多种有机酸等物质,对蚕能起过敏反应的物质主要是芳香油类。芳香油能引起蚕忌避拒食和产生胃毒作用,对养蚕极为不利。

三、桧柏与苹果、梨树、海棠混栽桧柏与苹果、梨树、海棠混栽或在果园附近栽植桧柏,就容易发生苹桧锈病。苹桧锈病主要为害苹果、梨、海棠的叶片、新梢和果实,而桧柏就是病菌的转主寄主。这种病菌在为害苹果、梨树、海棠后,转移到桧柏树上越冬,为害桧柏的嫩枝,次年继续为害苹果、梨、海棠,因此,它们不能混种在一起。

四、云杉与李混栽混栽后容易发生云杉球果锈病,感病球果提早枯裂,使种子产量和质量降低,严重影响云杉的天然更新和采种工作。

五、柑橘、葡萄与榆树混栽榆树是柑橘星天牛、褐天牛喜食的树木。若在柑橘、葡萄园栽植榆树,则会诱来天牛大量取食和繁衍,转而严重为害柑橘。此外,还易造成葡萄减产。

另外,果园附近也不宜栽植泡桐。果树的根部常发生紫纹羽病,轻者树势衰弱,叶黄早落,重者枝叶枯干,甚至会全株死亡。泡桐是紫纹羽病的重要寄主,因而加重果园紫纹羽病的发生。

1、苗木采购:

市场上销售的苗木有两种：裸根苗和带土球苗。选购裸根苗时首先要看苗木根系是否新鲜、是否发达；其次看植株高度、粗度、节间长度。节间太长，是徒长苗，不宜选择。再者看芽体是否饱满、紧实。带土球苗要选择土球稍大，土球不散的苗木为宜，然后看土球周围根系是否发达，其他条件同裸根苗。总之，要选择根系发达，枝条健壮，芽体饱满，无病虫害的苗木为佳。

绿化苗木的繁殖方式很多，常用的繁殖方式大概可以分为以下8类。

- 1、籽播繁殖:利用种子，播种育成新的苗木。
- 2、扦插繁殖:用苗木的枝条，扦插繁殖苗木。
- 3、埋条繁殖:把苗木枝条，整个横埋于育苗地育成的苗木。
- 4、根系繁殖:用苗木的根系，插入或埋入圃地培育的苗木。
- 5、根蘖繁殖:又叫留根苗，是利用地下的根系萌出新条育成的苗木。
- 6、嫁接繁殖:用嫁接方法育成的苗木。
- 7、压条繁殖:把不脱离母体的枝条埋入土中，或在空中包以湿润物，待生根后切离母体而育成的苗木。
- 8、组培繁殖:利用母体上的组织或细胞在营养液中育成的苗木。