

桂花 福建漳州 桂花

产品名称	桂花 福建漳州 桂花
公司名称	黄位林（个人）
价格	1.00/棵
规格参数	产地/厂家:福建漳州 品种:桂花 树高:5-8（m）
公司地址	中国 福建 龙海市 福建 漳州
联系电话	86 0596 6633805 13859289015

产品详情

产地/厂家	福建漳州	品种	桂花
树高	5-8（m）	主干高	2（m）
胸径	20-50（cm）	树型	脱杆头，爆炸头，都有
树龄	50		

桂花品种较多，常见的有丹桂、金桂、银桂、四季桂等。

桂花性喜温暖干燥、日照充足的环境和肥沃、排水良好的微酸性土壤。

盆栽桂花需在每年春季萌芽前换土一次，同时适当修剪过密和衰老的须根。4~9

月间宜放在通风向阳地方培养，浇水要见干见湿。忌浇水过多或雨后盆内积水。开花季节，浇水也不能太多，否则容易引起落蕾。桂花喜肥，生长季节每7~10天施一次腐熟的稀薄液肥，花前和花后各施一次干肥(酱渣，每盆约50克)。花前施，

可促使开花繁茂；花后施，促使来年新枝生长齐壮。桂花是香花花木，喜欢含磷、钾质的肥料，因此整个生长期，应适当多施磷、钾多的肥料。晚秋需移至0 以上的冷室内越冬，保持盆土略湿润，使其充分休眠，有利来年开花。问：如何让桂花多开花?答：要让桂花多开花、开花香，需抓住选好盆土、适时浇水、巧施追肥、适当修剪等4个主要环节。(1)桂花喜微酸性土壤。盆栽可选用山泥5份、腐殖土3份、沙土2份混合调制或用腐叶土和砂壤土各半作培养土。

如土壤酸性过强，则生长缓慢，叶枯黄。在碱性土壤中，约经2~3个月，即可导致叶片枯萎，甚至死亡。(2)浇水要适时。桂花浇水要掌握“二少一多”，即新梢发生前少浇水，阴雨天少浇水，夏秋季干旱天气需多浇水，平时浇水以经常保持盆土50%左右含水量为宜。阴雨天要及时排水，以防盆内积水烂根，否则易“淹死”。(3)巧施追肥。桂花喜猪粪，花谚云“要得桂花香，多备猪粪缸”。

如能从初春桂花出室后，即施用腐熟稀薄的猪粪液，4~5月约每10~15天施1次，6~7月每7~10天施1次；8月初施最后1次，则桂花生长茂盛，开花多，味香。城市没有猪粪，可用腐熟的饼肥液。如果施肥不足，则分枝少，花也少，而且不香。(4)适当修剪。桂花根系发达，萌发力强，成年的桂花树，每年抽梢两次。因此，要使桂花花繁叶茂，需适当修剪，保持生殖生长和营养生长的生理平衡。

一般应剪去徒长枝、细弱枝、病虫枝，以利通风透光，养分集中，促使桂花孕育更多、更饱满的花芽，则开花繁茂。问：盆栽桂花为何不开花?答：桂花喜强光，好温暖，忌积水，怕煤烟。桂花不开花，大体是由5种原因造成的。(1)冬季养护不当。冬季入室后放在低温处使其休眠，次年才能茁壮生长，花繁叶

茂。如室温较高，桂花得不到充分休眠，提前抽芽展叶，枝条细弱，消耗大量养分，春季出室后，遇干旱风易萎缩枯死。冬季浇水过多或放置地点光线不足，都易引起植株大量落叶，影响来年开花。(2)栽植地点过于荫蔽。桂花属长日照植物，喜强光。如生育期间植株得不到充分光照，导致枝叶徒长，影响花芽形成。(3)煤烟。桂花不耐烟尘，如让它生活在空气污染的地方，则生长不良，叶片变小并易脱落，开花少或不开花。(4)养分不足。盆栽桂花，年久未换盆、换土，致使养分不足，根系盘不能伸展。为此，盆栽宜每隔1~2年换盆一次，并施入少量蹄片作基肥。(5)浇水过量。桂花忌积水，生长季节浇水要见干见湿。如浇水过多或连阴雨使盆内积水，均易烂根、落叶。

问：如何繁殖桂花?答：盆栽桂花的繁殖多用靠接法，在夏至一伏天进行。砧木用2~3

年生小叶女贞，直径0.8厘米，选与砧木粗细相近的2年生桂花作接穗，

将砧木连盆移到接穗旁边，在无节处削去皮层，长3~5厘米，再在接穗的同等高度削个与砧木相同大小的切面，削口要平滑。两者形成层紧贴，用塑料条扎紧包严，接后3个月即可切离母株