

施田补除草剂 33%二甲戊乐灵

产品名称	施田补除草剂 33%二甲戊乐灵
公司名称	保定市科胜邦植保有限公司
价格	.00/个
规格参数	有效成分:33%二甲戊乐灵 有效含量 :33 (%) 用量:10 (g/ha)
公司地址	保定市利民街492号
联系电话	86-03122125158 13722425978

产品详情

有效成分	33%二甲戊乐灵	有效含量	33 (%)
用量	10 (g/ha)	用途	农药
生产厂家	德国巴斯夫	品牌	科胜邦植保
剂型	乳油		

规格：100ml*100瓶/250ml*40瓶/20ml*50袋*10盒

本品适用于甘蓝、韭菜、玉米及棉花多种旱田作物的选择性除草剂。可防治多中一年生禾本科及阔叶杂草，持效期长，可达45-60天。对作物安全，正常使用下不会引起棉花等作物根部畸形，并增加产量。水溶性及挥发性低，使用方便，可根据不同的作物类型选择播前混土，播后苗前，移栽前及苗后早期使用。

本品可防治或抑制以下杂草：稗草、马唐、狗尾草、千金子、牛筋草、碎米莎草、异型莎草、藜、苋、马齿苋、苘麻及龙葵等一年生杂草。

本品制造商：德国巴斯夫

说明：1、甘蓝、韭菜用量100-150ml/亩，移栽前施药：移栽前1-3天施药或老韭菜收割伤愈合后施药；播后苗前：种子条播后覆土2-3厘米，然后施药，避免种子直接接触药液。

2、玉米用量150-300ml/亩，播后苗前：将种子播种在2-5厘米深土中后覆土，再施药处理，避免种子直接接触药液；苗后早期：在玉米顶尖萌芽时及禾本科杂草叶心、阔叶草2叶期以前施药

3、棉花西北地区：用量175-200ml/亩，播前混土：先施药后均匀混土3-8厘米，再播种最后覆膜或先施药后混土，然后覆膜最后播种。

其他地区：用量150-175ml/亩，播后苗前：先播种后覆土，然后施药，最后覆膜，覆土时应避免种子外露

而造成药害。

注意事项：1、当杂草危害较重时使用高剂量，每季作物使用该除草剂不超过一次。

低温情况下或施药后浇水及降大雨可能会使作物产生轻微药害或影响药效，施药后7天左右表土干旱也会影响药效。

3、用药后请勿大水泼浇，以免破坏药土层，并将种子冲出。