

金叶榆造型树价格图片造型设计适合庭院园林

产品名称	金叶榆造型树价格图片造型设计适合庭院园林
公司名称	衡水德润景观工程有限公司
价格	10000.00/棵
规格参数	颜色:金黄色 高度:260-300 观赏部位:观叶
公司地址	衡水市人民西路1723号3幢1-101室
联系电话	13191692143 13303186577

产品详情

衡水德润景观工程有限公司于2009年7月31日注册成立，公司地址：衡水市人民西路1723号3幢1-101室，主要经营园林绿化、假山、假石、园林景观和绿地设施工程施工。（法律、法规禁止经营的不得经营，应审批的未获审批前不得经营）。企业类型：有限责任公司

衡水德润景观工程有限公司以“诚信务实，开拓进取，完善管理，互惠互利，共同发展”的经营方针，本着“诚信经营，以诚待人”的经营核心，力求得到更多客户的信任和支持。

造型技术

成功的树木造型是自然美与人工美的良好结合。不同树木种类的自然株形与观赏特性各异，造型的方式也不同。造型时还应考虑各种树木的生长发育规律。生长快速、再生力强的树种，整形修剪可稍重；而生长缓慢、再生力弱的种类修剪宜轻。一个完美的树木造型，须经多年以至数十年的努力才能完成，因此树木造型还须有远近结合的全面设想。树木造型的技术措施主要有以下几种，可单用一种或综合应用多种措施。

修剪 在树木造型中应用最多主要是通过剪截树干与枝叶,增加修剪后树木的整体观赏效果。修剪时期,落叶树木多在落叶后次春萌芽之前；常绿树则在春夏分两次进行。

盘扎 根据造型需要，将枝条进行绑缚牵引使其弯曲改向的措施。在桩景式造型中常用，多在树木生长季节进行。

编扎 根据造型需要，将一株、几株或数十株树木长在一起的枝条交互编扎而形成预想形状的措施。中国四川的花农常利用紫薇萌芽力强、枝条柔软、树皮薄易于编扎而且枝条相接触处很易愈合长成连理枝的特性，进行各种形式的紫薇造型，别具特色。编扎多在早春枝条萌芽前进行,编扎成型后,还需经常修剪、养护。

造型树修剪原则

园林植物修剪是一门科学，更是一门艺术。通过不同的修剪方式获得优美的树形，从而提高园林植物的观赏价值。园林植物修剪，就是按照各种不同植物种类的自然生长发育特性和园林生产需要，采用人工控制其长势、调节控制植物开花结果，防治病虫害，保证园林植物枝叶茂盛、繁花似锦，提高植物的观赏性。要根据园林生产的目的，提高植物移栽的成活率，减轻病虫害的发生，增强植物抗逆性，增加光照，增强树木光合作用，促进花芽分化，确保植物的健康成长。

造型树修剪注意事项

- 1、修剪不留桩头，也就是说被修剪的枝条应从基部剪掉。
- 2、修剪大的枝条枝干会留下较大的伤口创面，要及时用木炭或硫磺粉涂抹，以防止腐烂，还能起到杀菌收水的作用，也有利于伤口愈合。
- 3、修剪粗枝时，应先从枝条下方锯掉1/3长度，再从枝条上面锯断，可以防止拉伤树皮。
- 4、修剪之前先看看枝条分布情况，看清整体树势，切忌盲目下剪，要多看看树木四周，做到心中有数再下剪刀。
- 5、有些球型树不可用大平剪修剪，只能用剪枝剪修剪，以短截为主，抽剪为辅，使修剪后的树木自然美观。

造型树金叶榆树苗常见病害

造型树金叶榆叶片金黄色，具光泽，色泽明艳，叶脉明显，质感好；造型树金叶榆的枝条浓密，树冠丰满，易于造型。造型树金叶榆可在园林设计中应用：造型金叶榆球、造型金叶榆绿篱、造型金叶榆装点等。金叶榆与杨、柳、槐树并称为北方四大树种，其栽培广泛，适应性极强。金叶榆继承了榆树优良的对温度的适应，抗盐碱性，可用于山地绿化和沿海地区的园林绿化。造型树金叶榆抗逆性强，抗病性也很强，危害杨树、柳树的一些毁灭性病害都不会造成金叶榆死亡，所以造型树金叶榆有超长的寿命。但是在造型树金叶榆培养长期常常受到栎树流胶病、豹蠹蛾、桃红劲天牛等虫害威胁造成金叶榆叶片残缺，叶片出现斑点等，严重影响彩叶树种的观赏价值。

（1）栎树流胶病：该病可由多种原因引起，大致可分为生理性流胶，如冻害、日灼，机械损伤造成的伤口，虫害造成的伤口等；还有侵染性流胶，细菌、真菌都可引起流胶，致病病菌尚不清楚。

防治措施：在早春萌动前喷石硫合剂，每10天喷1次，连喷两次，以杀死越冬病菌。发病期喷百菌清或多菌灵800至1000倍液。

（2）豹蠹蛾：一年一代，以幼虫越冬。4月上旬越冬幼虫开始活动为害，5月中旬陆续化蛹，6月上旬成虫羽化交尾产卵，6月下旬幼虫孵化。幼虫可由叶柄基部、叶片主脉后部或直接蛀入枝条内，被蛀枝条先端枯萎。幼虫可转移为害，也可在虫道内掉头，10月份幼虫蛀入二年生枝条越冬。该虫钻蛀危害时排出大量颗粒状木屑。受害植株八九月份出现大量枯枝，严重破坏景观。

防治措施：最有效的防治方法是人工剪除带虫枝、枯枝。也可在幼虫孵化蛀入期喷洒触杀药剂，如见虫杀1000倍液，或用吡虫啉2000倍液等内吸药剂防治。

（3）桃红劲天牛：主要危害木质部。卵多产于树势衰弱枝干树皮缝隙中，幼虫孵出后向下蛀食韧皮部。次年春天幼虫恢复活动后，继续向下由皮层逐渐蛀食至木质部表层，初期形成短浅的椭圆形蛀道，中部凹陷。6月份以后由蛀道中部蛀入木质部，蛀道不规则。随后幼虫由上向下蛀食，在树干中蛀成弯曲无规则的孔道，有的孔道长达50cm。仔细观察，在树干蛀孔外和地面上常有大量排出的红褐色粪屑。

防治措施：用药剂注干防治桃红劲天牛效果较好，可选用内吸性杀虫。

联系人：刘强

联系电话：13303186577

地址：河北省衡水市桃城区人民西路1723号

非常高兴和您相识，愿明天与您相知，我们将成为您忠诚的朋友，我们愿以一流的信誉、一流的质量、一流的服务，让您高兴而来，满意而归！