番茄辣椒灰霉病专用药叶霉病特效药

产品名称	番茄辣椒灰霉病专用药叶霉病特效药
公司名称	潍坊奥丰作物病害防治服务有限公司
价格	12.00/瓶
规格参数	瓶:100ml 箱:40瓶 箱:480元
公司地址	寒亭区通亭街282号
联系电话	18678020209 15265643021

产品详情

辣椒番茄叶霉病、灰霉病识别与防治

番茄叶霉病和灰霉病是生产中常见的两种病害，除危害番茄外，还可危害茄子、辣椒、黄瓜、菜豆、瓠瓜等20多种作物。近期大部分地区会有阴雨天气，需要重点防治这两种高湿病害。今天潍坊奥丰专家教你识别防治叶霉病和灰霉病的小技巧。

相同点：都属于真菌性病害

1、发病条件：多雨、连续阴雨时发病较重。

2、发病部位：病害叶片发病时叶正、叶背均会产生霉层。

不同点：

1、危害部位：

叶霉病主要危害叶片，灰霉病主要危害果实，严重时也危害其他部位。

2、症状不同：

叶片危害症状不同：

番茄叶霉病叶片染病多从中、下部叶片开始，向上部叶片发展，并在叶片正面形成不规则圆形或椭圆形淡黄色褪绿斑，边缘不明显，叶背面出现灰白色至黑褐色霉层，后期变成紫灰色或深灰色至黑色或黄褐色，严重时叶片干枯、卷曲。叶霉病如下图：

番茄灰霉病叶片染病多从叶尖或叶缘开始，形成明显的“Ｖ”形斑，表面生灰色霉层，潮湿时病斑背面也产生灰色或灰绿色霉层，叶片逐渐枯死；灰霉病如下图

果实危害症状不同：

番茄叶霉病：果实发病时果蒂附近或果面上形成黑色圆形或不规则斑块，硬化凹陷，不能食用。

番茄灰霉病：果实染病青果发病最重，由残花和花托处发病，向果实或果柄扩展。果皮变成灰白色水浸状，然后变软腐烂，烂果长灰色霉层，果实失水后产生僵果。如下图：

3、发病条件不同：叶霉病是高温高湿病害，灰霉病是低温高湿病害。

4、发病规律不同：

叶霉病在高温高湿条件下易发病，过于密植通风不良，湿度过大，发病严重。在温室、大棚环境，湿度高、光照差，有利于病害的发生。所以秋大棚比温室发病重，温室比露地发病重。

灰霉病在低温高湿、弱光下易于发病。花期是灰霉病侵染高峰期。病原菌从伤口、衰老的器官和花器侵入。番茄蕉花后不易脱落的花瓣、柱头是容易感病的部位，致使果实感病软腐。借气流传播和农事操作传带进行再侵染。大水漫灌又遇连阴天是诱发灰霉病的重要因素。密度过大，放风不及时，氮肥过量造成碱性土壤缺钙，生长衰弱时发病重。

番茄灰霉病和叶霉病虽然存在一定的差异，到是都属于真菌性病害，可采用相同管理措施和药剂防治方法。

农业措施：

保护地棚室要高畦覆地膜栽培，地膜下渗浇小水。必须浇水时，则应在上午进行，且水量要小。有条件的可以考虑采用滴灌措施，节水控湿。加强通风透光，尤其是阴天除要注意控水。及时去除残花残叶和病害部位。注意不要在阴雨天气进行整枝打杈。清除集中烧毁和深埋病枝蔓。经验表明，只要叶片表面没有水膜，不仅仅是灰霉病、叶霉病，其他许多病害的发生机会均会大大降低。

药剂防治：重点抓住移栽前、开花期和果实膨大期三个时期的用药。

预防方案：

霉止或靓果安30-50ml+大蒜油5-15ml +沃丰素25ml+有机硅兑水30斤，定期喷雾。

治疗方案；

霉止或靓果安70-100ml+大蒜油5-15ml+沃丰素25ml+有机硅兑水30斤连喷2-3次，3天喷施1次，病情严重的可复配其它化学药，控制后改为预防。