

# 石柱土鸡苗厂家直销石柱土鸡苗养殖前景

产品名称	石柱土鸡苗厂家直销石柱土鸡苗养殖前景
公司名称	重庆市久俊农业开发有限公司
价格	2.50/只
规格参数	品牌:自生源 产品规格:出壳苗 产地:重庆梁平
公司地址	重庆市梁平县隆鑫花漾城B区2-223
联系电话	023-53392999 13896289571

## 产品详情

### 石柱土鸡苗厂家直销石柱土鸡苗养殖前景

重庆脱温鸡批发价格,本地纯种土鸡苗就选自生源土鸡品牌,土鸡苗批发价格,土鸡苗多少钱一只。重庆久俊农业开发有限公司(自生源土鸡苗养殖孵化基地)提供鸡苗,土鸡苗,香鸡苗、绿壳蛋鸡苗、瑶鸡苗、青脚鸡苗、旧院黑鸡苗、土鸡,土鸡蛋,重庆土鸡苗,四川土鸡苗,土鸡行情,土鸡养殖技术,青脚土鸡苗,绿壳蛋鸡苗,黑鸡苗,白条鸡,固始鸡,瑶鸡,土鸡苗价格,土鸡苗养殖,土鸡苗批发,土鸡苗新品行情咨询服务。全国咨询热线:13896289571

养土鸡的方法农村饲养的土鸡肉质好、味道鲜,深受消费者喜欢。但由于它生长速度慢(4个月才长大出栏),农户零星散养量不多,因而养殖者的总体经济效益不高,难增收致富。如何改变这一现状,开发农村土鸡产业,使土鸡长得快,肉质又好,户养量多呢?采用"优质高效养殖土鸡新技术"养殖土鸡,既能达到保持土鸡肉特色,又有较快的增重速度(90-100天达2-2.5公斤),农户如果养得多,每只鸡能获利15-20元现将技术要点介绍于下:1、品种选择:自生源青脚土鸡,又名叫柴鸡。成鸡的羽毛色泽红亮、尾巴颜色为油亮的黑色,冠大直立,抗病能力强且成活率高,适宜野外放养。2、育雏中主要注意几点: 室温:0-1周龄时为35-32,2-3周龄时为31-24,4周龄为23-20,也可在1周龄之后以每天降0.5。 相对湿度:室内的相对湿度保持55%-65%,即10天之前为60-65%,10天之后为55%-60%;室内保持空气新鲜,无刺鼻、熏眼的感觉。 补充光照:头5天可保持每天23小时的光照,以后为17小时的光照(包括自然光照在内)。 适时饮水和开食。小鸡应尽早开食和饮水,而且做到料、水不断,自由采食。在初次的饮水中加入5%的葡萄糖,连用两天;第三天在饮水中加入0.02%-0.03%的高锰酸钾。高密度育雏。在15天之前为60-70只/平方米,一般每批育雏在5000只以上(视养殖户对雏鸡的需求量来定育雏规模)。“网、床、散”结合养殖户应根据自己饲养的数量来适当改造鸡舍,要求室内地面为水泥地面,有窗户和地窗,使空气流通和采光充足。并做好网床或鸡笼,立体式三层为宜。网床的多少以养鸡的数量来定,一般按45-20只/平方米来计算(前期密度大一点)。网床第一层离地面高40厘米,网床高30厘米,上下层之间的距离20厘米,一二层网床顶部应搁置承粪板(可用三层板),网床的骨架部位用木材或白夹竹,网床四周和底部用1厘米×1厘米网目的塑料网固定好,料桶和饮水器均置于网床内。将庭院林地用尼龙网围起来,每隔2-3米远打一根桩柱,将尼龙网捆在桩柱上,靠地面的网边用泥土压实

。所圈围场地的面积，一般以每只鸡不少于1.5平方米计算，越宽越好。买回的脱温小鸡（已经过育雏的小鸡）至1公斤体重的阶段在网床内饲养，1公斤后至出栏期间在所圈围的院林地内放养（雨天和霜雪天不放入），饲喂中做到料、水不断，自由采食。网床内饲养，鸡活动范围小、鸡体能量消耗少，增重加快；鸡在圈围的院林地散养，能捕食野生杂草和生物昆虫，改变食物结构，肉质品味高（保持土鸡肉质的品味）。3、日粮搭配选择营养全面、适口性好，易于消耗的肉鸡全价颗粒料，再适当搭配其他的饲料养鸡，才能保证鸡的正常生长发育，加快增重速度和鸡肉风味不变的目的。因此，要科学地搭配日粮。育雏期，应选用肉鸡全价颗粒料，最初开食时要将饲料稍浸泡转化一下，并用手搓碎一点。脱温鸡至1公斤体重期间，则选用中鸡料，更换时应逐步替换，不能一次性全部更换，以免造成应激反应。同时，应添加5%-10%的完整谷粒（或小麦），并给予10%-15%的青绿饲料。在庭院散养期间，选用大鸡全价颗粒料，日粮中还要加入10%-15%的完整谷粒（或小麦），添加15%-20%的青绿饲料。若光喂全价饲料，一来饲养成本高，效益不合算；二来鸡肉的肌间脂肪多，吃起来不爽口；三是无土鸡肉的独特风味，消费者不喜欢。添加适量的青绿饲料，一来可增加维生素的含量，二是可降低养殖成本，三可减少鸡肉的肌间脂肪含量。

3、消毒免疫 做好鸡的免疫接种和消毒防疫工作，防止传染病的发生和传播，这是规模养鸡成功的关键所在。因此，要搞好免疫接种和消毒防疫工作，减少鸡的死亡，提高成活率和商品率。对土鸡的免疫程序，应结合生产的性质（商品肉仔鸡）而定，最好是按肉鸡的免疫程序来参照进行，即1日龄的雏鸡免疫接种马立克氏疫苗（无条件时也可不搞，这主要是在孵化场搞）；6-7日龄的鸡用鸡新城疫 系苗（或v4苗）、法氏囊b87苗、传支h120苗等混合饮水免疫；24-28日龄用鸡新城疫 系苗饮水免疫一次；60日龄再用鸡新城疫 系苗注射接种一次，以后不再免疫接种。同时，在饲料饮水中添加一些药物预防疾病的发生，在2-7日龄添加0.02%的痢特灵和0.01%的土霉素或青霉素、庆大霉素等，13-17日龄又重复用上述药物；19-90日龄在饲料中添加氯苯、抗球王等抗球虫的药，进行驱虫、鸡舍每天要清扫干净，并用生石灰对地面和承粪板上进行消毒。每半月用复合酚兑水将舍外进行喷雾消毒，用百毒杀对鸡舍内带鸡消毒。出栏后对场地要彻底清扫、冲洗和消毒；鸡舍门口处的消毒池要经常有石灰或消毒液，并注意常更换。