

教你几招解决草莓根腐病、草莓炭疽病！

产品名称	教你几招解决草莓根腐病、草莓炭疽病！
公司名称	潍坊华诺生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	潍城区北宫西街（交警大队北）
联系电话	186-7808-2926 18678082926

产品详情

草莓红中柱根腐病和炭疽病是为害草莓正常生长的两大病害，也是夏季草莓育苗期非常重要的病害，感染炭疽病和根腐病的草莓苗用于生产，定植后一段时期也易发生不同程度的死苗，严重的需要全部毁种。因此，炭疽病和根腐病的防治工作必须引起人们的重视。

草莓炭疽病主要发生在育苗期(匍匐茎抽生期)和定植初期，结果期很少发生。染病后的明显特征是草莓株叶受害可造成局部病斑和全株萎蔫枯死。虽然不出现心叶矮化和黄化症状，但若取枯死病株根冠部横切面观察，可见自外向内发生褐变，而维管束未变色。

草莓红中柱根腐病病症：下部老叶叶缘变紫红色或紫褐色，逐渐向上扩展，全株萎蔫或枯死。检视根部可见根系变褐腐朽，易拔起，剖开主根，中心柱变为赤褐色。根部腐烂从里向外扩散。整条根干枯，地上部叶片变黄或萎蔫，最后全株枯死。

5月下旬后，当气温上升到25℃以上，草莓匍匐茎或近地面的幼嫩组织易受病菌侵染，7~9月间在高温高湿条件下，炭疽病菌传播蔓延迅速。特别是连续阴雨或阵雨2~5天或台风过后的草莓连作田、老残叶多、氮肥过量、植株幼嫩及通风透光差的苗地发病严重，可在短时期内造成毁灭性的损失。红中柱根腐病在土壤温度低湿度高条件下易发病，一般春秋多雨年份易发病，低洼地排水不良或大水漫灌地块发病重。

育苗期管理：及时摘除花茎，结合除草清理枯叶和病叶。及时整理匍匐茎和压蔓，使其均匀分布，保持通风透光。育苗期用药，可保证苗子在育苗期不受炭疽病和根腐病的侵染，在后期移栽后发生病害的概

率更低，做到未雨绸缪，防患于未然。可用青枯立克150-300倍+细截200-300倍+沃丰素600倍均匀灌根并配合喷雾。母株苗定植后，喷施一次，每隔15-20天用药一次，连用5-6次。中草药制剂安全有效，做过的破坏性试验表明50倍以上的浓度在任何时期施用都是安全的，而且能够上下传导吸收的有效成分，既能营养复壮，又能杀灭潜藏在体内和土壤根系附近的真细菌，为后期移栽提供安全健康的草莓苗，能够减少后期很多病害的发生，起到事半功倍的效果。

客户服务：刘经理，咨询电话/微信：18678082926，QQ：252041832