

猕猴桃溃疡病解决这些问题，病害会大大降低！

产品名称	猕猴桃溃疡病解决这些问题，病害会大大降低！
公司名称	潍坊华诺生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	潍城区北宫西街（交警大队北）
联系电话	186-7808-2926 18678082926

产品详情

已经种植猕猴桃的农户，主要从提高栽培管理水平上来防治猕猴桃溃疡病，栽培管理主要是分为灌溉、施肥、修剪、清园、预防冻害、防病害等几个方面：

灌溉 猕猴桃怕旱，不耐涝，如果连续下雨而排水不良，则使根部处于水淹状态，影响根的呼吸，时间长了根系组织腐烂，植株死亡。因此果园应修建完备的排、灌系统。

合理施肥 施肥种类上，多用有机肥，生物菌和中微量元素。土壤有机质不足，土壤中硼、磷元素缺乏等易造成病原菌侵染树体伤口而引起溃疡病。不要过多使用化肥，尤其是偏施氮肥，表面上看树长的较大，但是只能虚长条子，使得树皮虚、薄，枝条中空。由于有机肥肥效慢，施基肥的最佳时间为秋季落叶前1-2个月，春季长条阶段正好能够发挥肥效，若是冬季施肥，则促使夏季旺长，不利于长条和结果两者之间的营养平衡。有些地区的土质其实不太适合种植猕猴桃，但是已经种植的，就需要在施肥上下功夫了。施肥方式上，很多种植者施肥图省事，大水漫灌，施于浅表，这样导致根系上浮，根系过浅，直接导致树弱。

修剪 春季抹芽，夏季修剪控旺，适当培养结果母枝。依据树龄、树势、施肥条件等确定适宜负载量，合理负载培育健壮树势，增强抗病性。实行花前疏蕾（疏梢）、花期授粉、花后疏果定果。不要一味追求挂果量，收益固然重要，但是要讲究自然规律，否则就是杀鸡取卵。果树修剪后，注意保护剪口、锯口，可涂抹《奥力克-溃腐灵》，预防溃疡病菌侵染。

清园 将修剪的病枝、刮除树干粗老翘皮、病叶或病果清除出果园，集中烧毁或深埋，减少初侵染源，以免病害在果园扩展蔓延。

预防冻害、寒害、倒春寒 秋末冬初应采取防冻措施，如树干缠草、基部培土、树盘灌水，预防树体受冻，减少冻伤口，防止病菌入侵。冬末春初，进行树干涂白，防止晚霜冻和日灼，兼有杀菌、治虫等作用。

药剂防治

还没有建园的猕猴桃果农朋友们，可以从选址、选品种等进行选择。

选址 选用便于浇灌和排水的地块建园，猕猴桃适宜栽植于背风处，防止冬季的风害引起树皮冻害出现伤口，感染溃疡病。合理规划栽植密度，考虑通风透光性，减少病原菌的侵入、传播和危害。

品种 采用优良抗病品种防治溃疡病是最经济有效的方法。要选用适宜当地生产的优良抗病品种，如徐香、海沃德、金魁、贵长等。发病重灾区要慎重发展易感病的中华猕猴桃品种。避免中华、美味混栽。

对于猕猴桃溃疡病的防治，要坚持“早防重治，医养结合”的原则，总体防治要求是以培育健壮树势为重点，抓住秋季预防与春季治疗关键期，实行统防统治，全程防控。

治疗方案如下：

1、涂抹或刷干：有流水（包括流红水和流白水）的，使用《奥力克-溃腐灵》原液涂抹或刷干。用药范围大于病斑范围，涂抹2-5次，隔3-5天涂一次。（去年有溃疡的今年在萌芽前注意多刷干）

2、灌根：对溃疡严重的病株，在涂抹或刷干的基础上同时采取灌根的办法，具体为：使用《奥力克-青枯立克》100-300倍液+《沃丰素》600倍灌根1-2次，间隔7-10天，以灌透毛细根区为准。

3、喷雾：萌芽前使用《奥力克-溃腐灵》30-60倍枝干喷雾；萌芽后，使用《奥力克-溃腐灵》150-300倍喷雾2次，间隔7天左右。后期用《奥力克-靓果安》300倍+《沃丰素》600倍+《大蒜油》1000倍周年喷雾，每次间隔7-10天。