

柑橘溃疡病杀菌疮痂溃疡净治脐橙沃柑溃疡病炭疽病疮痂病杀菌使用方法

产品名称	柑橘溃疡病杀菌疮痂溃疡净治脐橙沃柑溃疡病炭疽病疮痂病杀菌使用方法
公司名称	郑州喜兰特生物技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:500g/瓶
公司地址	郑州市高新技术产业开发区
联系电话	19937608808

产品详情

柑橘种植过程中烦恼的就是柑橘在4、5、6、7、8、9月份会爆发柑橘溃疡病、腐烂病、砂皮病、炭疽病、疮痂病等细菌、真菌性病害，而且发病很难控制，遇到雨水，传播速度更快，严重时导致果树腐烂,降低商品价值，损害果农经理效益，那么柑橘溃疡病应该怎么防治呢？

首先了解柑橘溃疡病、砂皮病、炭疽病、疮痂病的危害，柑橘溃疡病是一种细菌性病害，病菌的适生长温度是25-35℃，病菌是通过雨水、昆虫、苗木、接穗和果实进行传播，从寄主气孔、皮孔或伤口侵入，生长季节潜育期3-10天。主要危害的是柑橘的叶、花、果及新梢，受害叶片正、背两面均匀隆起，形成近圆形病斑，病斑表面木栓化，粗糙，灰褐色，后病部中心凹陷，呈火山口状开裂，病斑周围有黄色晕圈。果实上的病斑与叶片上的病斑大体相似，但周围无黄色晕圈，只危害果皮不危害果肉，严重时引起落果。枝梢病斑与果实病斑相似，严重时引起叶片脱落，枝梢枯死。

发病规律及传播途径

病菌在病叶、病枝或病果内越冬，第二年开春回暖季节遇水从病部溢出，通过雨水、昆虫、苗木、人工器具及枝叶接触进行传播，从寄主气孔、皮孔或伤口侵入。该病从4月-11月均可侵染发病，以9月夏梢易感病，秋梢次之，早秋梢晚春梢再次之，春梢和冬梢不易感病。

现阶段包括溃疡病在内的很多病害，除了引种带病菌到园区，大多数都在栽培管理上出现了问题，因此要重视栽培管理水平的提高。

首先要做好虫害的防治工作，减少枝叶伤口，避免病菌侵入；其次，根据该病菌在温度、湿度大时易繁殖感染的特点，做好抹芽控梢工作。结果树要彻底抹除夏梢，早放秋梢，病树要控制夏、秋梢，多留老熟春梢，在新梢老熟前期增施钾肥，促使枝梢健壮；第三，要及时剪除病枝、病叶和病果并集中烧毁，尤其要做好冬季清园工作，收集落叶、落果和枯枝烧毁，每次剪除一株病树枝叶后，可以及时用酒精对

枝剪进行消毒。柑橘溃疡病、腐烂病、砂皮病、炭疽病、疮痂病害提前做好预防。4、5、6月份正处于谢花和果实生长期，一定提前做好预防控制，可以喷施喜百农疮痂溃疡净柑橘药剂。果园全方位均匀喷施。

喜百农疮痂溃疡净属生物杀菌剂,通过破坏各类病原体的细胞膜、凝固蛋白阻止呼吸和酵素活动等方式达到杀菌目的。该药有一定的内吸和渗透作用,主要作用机理是抑制病原菌孢子形成而将病原菌杀死。可用于防治柑橘树腐烂病及柑橘的疮痂病、炭疽病、溃疡病、烟煤病、砂皮病等。发病前使用疮痂溃疡净稀释800-1000倍整个果园均匀喷雾提前预防，带走病枝病叶枯枝烂叶。已经发病植株用稀释600倍液均匀喷雾。

喜百农柑橘疮痂溃疡净

专治柑橘溃疡病、砂皮病、炭疽病、疮痂病杀菌剂，治病、美果、好收成，把丰收的喜悦带给农民。