成都大樱桃树苗批发，到彭州大樱桃苗专业生产基地。

产品名称	成都大樱桃树苗批发，到彭州大樱桃苗专业生产基地。
公司名称	成都亲亲田园甜樱桃种植农民专业合作社
价格	15.00/棵
规格参数	移栽时间:秋冬春 品种纯度:100% 树苗年限:2年
公司地址	四川省成都市彭州市丽春镇跃进村3组
联系电话	18284557577

产品详情

成都大樱桃苗哪里有，成都大樱桃树苗批发，成都彭州专业樱桃苗木基地。

亲亲田园 大樱桃苗订购电话【微 信同号】182 8455 7577 何主管，

，基地供应四川大樱桃苗、重庆大樱桃苗、云南大樱桃苗、贵州大樱桃苗、湖南大樱桃苗、湖北大樱桃苗、陕西大樱桃苗。欢迎到我基地实地考察，参观。

亲亲田园基地年产大樱桃苗100余万株，1-5公分各品种、大小、规格齐全。其中1公分以下（小苗），年产45万株，批发价5元/株；2公分以上（中苗），年产25万株，批发价15元/株；3公分以上（大苗），年产10万株，批发价35元/株。

大樱桃对光照有什么要求？

樱桃喜光性较强，对光照的要求比其他落叶果树高。其中甜樱桃喜光性最强,真次是酸樱桃。光照条件良好时,树体健壮,果枝寿命长,花芽充实,坐果率高,果实成熟早,着色好,糖度高,酸味少。光照条件差时,树冠外围新梢徒长,冠内枝条衰弱,果枝寿命缩短,结果部位外移,花芽发育不良,坐果少,果实成熟晚,品质差。应选阳坡或半阳坡建园,栽植密度适宜,同时还要注意树冠结构、布局。

大樱桃对土壤有什么要求?

樱桃的根系呼吸旺盛,它既要求土层深厚肥沃,又要求通风良好。土层深厚、土质疏松、透气性好、保水较

强的砂壤土适宜樱桃栽培。栽于土质黏重、透气性差的黏土地,根系分布浅,易旱、易涝,也不抗风。樱桃对土壤盐渍化程度的反应较为敏感, 盐碱地不宜栽植樱桃。适宜的土壤
pH5.6~7.0。樱桃对重茬较为敏感,樱桃园间伐后,至少应种植3年其他作物后才能再栽樱桃。

风对大樱桃有什么影响?怎样预防风害?

樱桃的抗风能力较差。休眠期大风易造成枝条“ 抽干 ”及花芽冻害。花期大风能吹干柱头，降低授粉受精能力，同时影响昆虫传粉。新梢生长期大风造成偏冠。夏秋季的台风会造成枝折树倒。常有大风侵袭的地区，特别是沿海地区，要注意设置防风林带预防风害。

大樱桃树夏季管理要点,管理大樱桃树新技术

夏季是大樱桃树生长的关键时期，病虫害也极易发生，所以，果农朋友应该重视大樱桃树夏季的管理。做好以下几点就可以使大樱桃树顺利度过夏季这一生长期。

一、 合理夏剪大樱桃树

据研究，大樱桃花芽生理分化期多集中在春梢停长，采果后10天左右时间内进行，形态分化期在其后1～2个月内完成，因此采用多种夏剪手法，平衡树势，促使营养生长向生殖生长转化是促进花芽分化的重要措施。另外，合理的夏剪还可以极大的减少冬剪量，节省大量的人力。此项工作应在采果后立即进行。

二、 大樱桃树进行肥水管理

大樱桃果实发育期短，需要养分集中，注意花前、果实发育期及采果后、秋季的追肥，第一次以氮肥为主配合磷钾肥，第二次以磷钾肥为主，采果后以复合肥为主，也可施腐熟人粪尿、腐熟豆饼水等(土杂肥以秋施为好)，这次施肥有利于花芽分化，提高来年产量。施肥后要灌水，谢花后至果实成熟前，如天气干旱，注意灌水保证充足的水分供应，雨季要特别注意排涝。

三、 对大樱桃树适时浇水。

大樱桃既不抗旱，也不耐涝。而北方地区雨水又不均匀，在早春浇好花前水的基础上，如夏季干旱，还要浇好硬核水、采前水和采后水。根据北方雨水规律，在6月下旬应注意防旱，根据土壤墒情，及时灌水；而在7～8月份为多雨季节，要做好园内的排水防涝工作。

四、 大樱桃树施多效唑。

进入3年生的旺大樱桃树，山东、河南等地在4月下旬和6月中旬施多效唑，每株施5克。据试验，5月上旬土施多效唑效果较好，6月上中旬大部分枝条封顶，成花率为95%，而没有施多效唑的成花率仅为20%。

五、防裂采收。

大樱桃采收前，由于浇水、降雨、大雾等，果肉细胞吸水迅速膨大，各种生理活动加快，但果皮细胞生理活动相对缓慢，当果实膨压增大到超过果皮及果肉细胞壁所能承受的压力时，便会引起裂果。其采前

裂果还常与果实缺钙密切相关，而补充钙又是预防大樱桃采前裂果的重要措施。补钙方法是：从花后两周左右开始，每隔10天左右喷布一次300～500倍的氨基酸钙，或150倍氢氧化钙液和100倍氯化钙液，共2～3次，可明显减轻裂果。根据果实成熟度、用途和市场需求综合确定采收期，成熟不一致的品种应分期采收。

六、防治病虫。

夏季为害大樱桃的主要病虫害有：流胶病、桑白蚧、造桥虫和桃潜叶蛾等。①流胶病，在流胶初期用刀在病斑处纵割几刀挤出汁液，然后涂刷石硫合剂有一定效果。另一种方法是将病部刮去，然后用草木灰敷上塑料条缠住即可。②桑白蚧：于5月中旬第1代若虫扩展期喷48%的乐斯本1500倍液或30%蜡蚧灵1000倍液可控制其为害，在7月上旬喷药防治其第2代若虫。③造桥虫和桃潜叶蛾，可喷2.5%敌杀死乳油3000倍液+25%喹硫磷乳油800～1000倍液进行防治。