

批发优质 侧柏种子 95 (%)

产品名称	批发优质 侧柏种子 95 (%)
公司名称	宿迁艺新花卉苗木基地
价格	32.00/千克
规格参数	发芽率:95 (%) 品种纯度:98 (%) 颜色:灰色
公司地址	中国 江苏 宿迁市宿城区 江苏省宿迁市
联系电话	0527 0527 83390637 18796491576

产品详情

发芽率	95 (%)	品种纯度	98 (%)
颜色	灰色	学名	侧柏
生长适温	10-35	科属	常绿乔木
株高	欢迎来电咨询 (公分)	直径	欢迎来电咨询 (mm)
新奇创意项目	报名		

侧柏为常绿乔木。扁柏、香柏。在中国分布极广，北起内蒙古、吉林，南至广东及广西北部；人工栽培范围几遍全国。是优良的园林绿化树种。木质软硬适中，细致，有香气，耐腐力强，多用于建筑、家具、细木工等；种子、根、叶和树皮可入药；用种子榨油，供制皂、食用或药用。树高一般可达20米。中文学名：侧柏c è b i拉丁学名： platycladus orientalis (linn.)franco别称：英文名oriental arborvitae界：植物界科：柏科 cupressaceae属：侧柏属 树皮红褐色，纵裂。小枝扁平。叶鳞片状，小形。雌雄同株，球花单生枝顶。球果近卵形。种子长卵形，无翅。侧柏喜光，但幼苗、幼树有一定耐荫能力。较耐寒，抗风力较差。耐干旱，喜湿润，但不耐水淹。耐贫瘠，可在微酸性至微碱性土壤上生长。生长缓慢。寿命极长。播种前种子可用温水处理。育苗方式多用床式或大田式。一般春季播种，播后约10天幼苗出土。主要造林地多选海拔1500米以下的山地阳坡、半阳坡，以及轻盐碱地和砂地。一般整地后植苗造林，有条件的地方也可直播。主要虫害有侧柏毒蛾、双条杉天牛、松梢小卷蛾。

播种育苗技术 侧柏种植技术 侧柏是我国最广泛应用的园林树种之一。只古以来即常植于寺庙，陵墓地等处。此外，由于侧柏寿命长，树姿美，所以各地多有栽培。常用于庭院中散栽，群植或于建筑物四周种植。又因耐修剪，也可做绿篱栽培。

采种：选20---30年生以上的健壮母树采种。种子9---10月成熟，出种率约10%。每公斤种约4.5万粒。育苗：9月中旬至10月中旬播种。播种前用温水浸种12小时，置篮筐内，放背风向阳处，每天清水淘洗一次并经常翻动，当有一半裂嘴即可播种。采用条播或撒播，每亩用种量10公斤。播种后保持苗床湿润，结合灌水进行追肥。造林：植苗造林，采用鱼鳞坑、窄幅梯田、水平阶、水平沟等整地。春、秋、雨三季都可栽植，雨季造林较易成活。宜营造混交林，可与桧木、元宝枫、黄连木、臭椿等带状混交。也可与黄栌、紫穗槐等进行间或株间混交。管理：造林后2---4年内每年松土除草1---3次，以促进生长。 1. 侧

柏选地、整地与施肥：侧柏育苗地，要选择地势平坦，排水良好，较肥沃的沙壤土或轻壤土为宜，要具有灌溉条件。不宜选土壤过于粘重或低洼积水地，也不要选在迎风口处。侧柏育苗地要深耕细耙，施足底肥。一般采取秋翻地，深度25厘米左右，春浅翻15厘米左右，结合秋季深翻地，每亩施人厩肥2500—5000千克，将粪肥翻入土中，然后，耙耨整平。

2. 播前种子催芽处理：播种前为使种子发芽迅速、整齐，最好进行催芽处理。侧柏种子空粒较多，先进行水选后，将浮上的空粒捞出。再用0.3%—0.5%硫酸铜溶液浸种1~2小时，或0.5%高锰酸钾溶液浸种2小时，进行种子消毒。然后，进行种子催芽处理。目前经常用于侧柏种子催芽的方法有3种。

(1)混雪埋藏法：选择背风、背阴、排水良好、管理方便的地方，入冬后当积雪不融化时，把种子混拌3倍的雪，装入囤子中。囤子上下和四周要围以草帘和10厘米厚的雪，中间放入混雪的种子。囤子外面围上成捆稻草，以保持早春囤子里的雪不融化。一直雪藏到播种前3—5天取出，雪化净后种子筛选出阴干散落，清除杂物，即可播种。也可采取播前1周左右，化雪后种子混细沙，日晒、翻拌、增温保湿，待有1/3种子裂嘴，筛除沙子或混沙及时播种。

(2)侧柏混沙催芽法：当种子调入很晚来不及雪藏或冬季雪少无法雪藏时，可于播种前15~20天采用混沙催芽。即将经过选种消毒处理的种子，用温水浸种24小时。然后捞出种子，按种子体积的2倍混入细沙，拌均匀，沙子湿度以手握成团而不出水为宜，装入木箱中放置在室内温暖处，种沙温度经常保持在12—15℃，每日翻动2—3次，并随时喷洒温水，保持适当的温、湿度，以促进种子萌发。待大部分种子已经萌动，有1/3种子裂口，即可播种。

(3)侧柏温水浸种催芽法：将经过消毒处理的种子用45℃温水浸种24小时，结合选种，将浮上的空粒种子捞出去掉。然后将种子捞出摊晒在背风向阳处席子上，经常翻倒晾晒，保持一定的湿度，每天用温水冲洗1—2次。经过5~6天，待有1/3的种子裂嘴，可进行播种。

3、侧柏播种：侧柏适于春播，但因各地气候条件的差异，播种时间也不相同。侧柏生长缓慢，为延长苗木的生育期，应根据当地气候条件适期早播为宜，如华北地区3月中、下旬，西北地区3月下旬至4月上旬，而东北地区则以4月中、下旬为好。侧柏种子空粒较多，通常经过水选、催芽处理后再播种。为确保苗木产量和质量，播种量不宜过小，当种子净度为90%以上，种子发芽率85%以上时，每亩播种量10千克左右为宜。