

# 甜菜夜蛾小菜蛾烟青虫蔬菜果树全打型杀虫剂金宽

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 甜菜夜蛾小菜蛾烟青虫蔬菜果树全打型杀虫剂金宽 |
| 公司名称 | 海南康拓森生物科技有限公司          |
| 价格   | .00/个                  |
| 规格参数 | 规格:20ml*300瓶           |
| 公司地址 | 海口市坡博路1号虹冠大厦3单元1003室   |
| 联系电话 | 18695805815            |

## 产品详情

【产品说明】：金宽 苏云金杆菌苏云金杆菌，简称Bt,是包括许多变种的一类产晶体芽孢杆菌。该菌可产生两大类毒素，即内毒素（伴胞晶体）和外毒素，使害虫停止取食，最后害虫因饥饿和中毒死亡。因此该杆菌可做微生物源低毒杀虫剂，用于防治直翅目、鞘翅目、双翅目、膜翅目，特别是鳞翅目的多种害虫。

菜青虫的幼虫，主要为害甘蓝、芥菜、花椰菜、白菜、油菜、萝卜等十字花科蔬菜。菜青虫咬食叶片，小的幼虫仅啃食叶肉，留下一层透明表皮，随着幼虫生长，食量增加，把叶片吃成孔洞或缺刻，严重时叶片全部被吃光，只残留粗叶脉和叶柄。

菜青虫的成虫，即菜粉蝶/白蝴蝶在白天活动，以晴天中午活动最盛，寿命2-5周。成虫一般只选择十字花科植物产卵，卵多产于叶片背面，也可产在叶片正面，散产。老熟幼虫多在中上部叶片背面化蛹。菜青虫在危害作物的同时排出大量粪便，污染菜叶和菜心，使蔬菜品质降低，且虫伤又为病害提供了入侵途径，加速全株死亡。

烟青虫主要为害辣椒和烟草，喜食辣椒果实，也为害花、蕾、芽、叶和嫩茎。初孵幼虫能日夜活动危害，3龄后食量增大，能转株、转果为害。为害辣椒时，烟青虫全身蛀入果内，果实外可见孔沿，整个幼虫钻蛀果实内，啃食并排泄大量粪便，果表仅留1个蛀孔，果肉和胎座被取食，残留果皮，果内积满虫粪和蜕皮，使果实不能食用。

防治烟青虫必须将幼虫消灭在蛀果前，一旦幼虫蛀入果头，药剂防治的效果很差。因此，确定最佳防治适期显得尤其重要。在低龄幼虫尚未蛀果前、百株幼虫头数超过5头时，即开始用药防治。