

供应鸡血藤苗1号场 鸡血藤种苗习性

产品名称	供应鸡血藤苗1号场 鸡血藤种苗习性
公司名称	北流市富饶农产品苗木销售部
价格	4.00/株
规格参数	2:3 7:6x2 3:1x9
公司地址	北流市清湾镇白米村坡头组33号
联系电话	13978515312

产品详情

供应鸡血藤苗1号场 鸡血藤种苗习性电话13978515312

鸡血藤的介绍

鸡血藤茎藤呈扁圆柱形，稍弯曲，直径2~7cm。表面灰棕色，有时可见灰白色斑，栓皮脱落处显红棕色，有明显的纵沟及小形点状皮孔。质坚硬，难折断，折断面呈不整齐的裂片状。

血藤片为椭圆形、长矩圆形或不规则的斜切片，厚3~10mm。切面木部红棕色或棕色，导管孔多数，不规则排列，皮部有树脂状分泌物，呈红棕色至黑棕色，并与木部相间排列成3~10个偏心性半圆形或圆形环。髓小，偏于一侧。气微，味涩。以树脂状分泌物多者为佳。

茎藤横切面

木栓细胞数列至数十列，微木化至木化，有的含棕色物。栓内层为2~4列细胞，内含棕色物。皮层窄，细胞10余列，含黄棕色物；石细胞众多，成群散在，层纹、孔沟明显，胞腔内充满红棕色物，少数含草酸钙方晶，其周围有的薄壁细胞含草酸钙方晶，含晶细胞壁木化增厚；分泌细胞少数，散在。维管束异型，由韧皮部与木质部相间排列成数个偏心性环。

每轮韧皮部最外侧为石细胞与纤维组成的厚壁组织环带，环带内外两侧细胞有时含草酸钙方晶；韧皮部分泌细胞常数个至10多个切向排列成层，含黄棕色、红棕色或金黄色分泌物；纤维束众多，散在，其周围细胞含草酸钙方晶形成晶纤维；石细胞少数，散在；射线宽1~4列细胞，弯曲，多被挤压。形成层明显。

木质部导管多单个或2个并列散在，直径约400 μm，有的内壁附有棕色块状物，多呈新月形；木薄壁细

胞多围绕导管，壁稍厚，多含棕色物，其间散布分泌细胞；木纤维亦均形成晶纤维，几呈层状排列；木质部射线细胞纹孔明显，有的含棕色物。髓小，偏心，环髓分泌细胞多数。

粉末特征

石细胞多成群，呈长方形、类圆形、三角形或方形，直径10~80 μm，有的胞腔内含红棕色色素；少数含草酸钙棱晶。纤维成束，纹孔及胞腔不明显，纤维束周围的细胞束含草酸钙棱晶，形成晶鞘纤维。

内含红棕色树脂状色素的分泌细胞众多，排列成条状或不规则块状。导管碎片主要为具缘纹孔，木栓细胞表面观多角形，壁有长圆状纹孔，木薄壁细胞纹孔细密。

鸡血藤的生态习性

鸡血藤为亚热带大型藤本，喜温暖、喜光也稍耐阴。盆栽土壤要求肥厚、疏松、排水良好的山土或腐叶土为宜，较耐旱，管理较粗放，适应性强。

鸡血藤适应性强，喜光，稍耐阴。喜深厚肥沃之地，但于瘠薄干旱处也能适应。鸡血藤生于山谷林间、溪边及灌丛中。

鸡血藤为亚热带藤木，喜温暖，不耐寒。性喜光，稍耐阴。喜深厚、肥沃、疏松、排水良好之地，耐干旱4薄，适应性强。多生于山坡灌丛或路边。幼年生长较慢，3-4年后生长迅速。性强健，茎蔓以右旋缠绕他物向上生长。

鸡血藤的栽培技术

鸡血藤育苗一般分为实生育苗和扦插育苗两种方法。在自然状态下鸡血藤结实率很低，采集困难，难以规模化育苗；试管组培技术难度大，投入高，风险大。以扦插育苗较为方便和经济。

1、选地整地

根据鸡血藤的生长环境可以选择海拔500米以下，排灌方便，背风潮湿的缓坡或者大田作为育苗的苗床地，以土层比较深厚的砂质土壤为宜。于头年冬天把土深翻一遍，把在土壤里越冬的大部分害虫冻死。到了次年每亩用300~500公斤农家肥或者50~100公斤复合肥作基肥，深翻起陇做苗床，苗床宽度在1.2米，高度20~30公分为宜。整平，用5%的高锰酸钾溶液进行喷洒消毒，苗床之间及四周挖好排水沟，要求排水通畅，畦沟内没有积水。再用黑色地膜覆盖在苗床上，四周撒上泥土、泥块压实。

2、扦插准备

在鸡血藤新芽萌动前，选择粗壮、无病虫害的1-2年生木质化枝条做为插条为宜，采集回来的枝条要及时淋水保湿。将枝条截成15-20cm、至少带有2个芽眼的茎段，剪除叶子，枝条基部要斜剪呈45度，顶部剪平，以便于区分头尾。顶部剪口距离芽眼约1厘米。采集到扦插，整个过程最好3到4天内进行完毕。

3、扦插

扦插前用ABT-2号生根剂或者吲哚乙酸类生根剂稀释溶液浸泡20分钟，浸泡深度约3公分（如图2所示）。然后取出晾干基部表皮水分，扦插前先用一条尖锐的木条按行距为15 * 15公分，以“梅花形”先扎出一个个小孔（“梅花形”可使苗木相互错开有利于光合作用），然后把插条沿着事先扎好的小孔和地面夹角为45度斜插入土，入土长度为整个枝条的三分之二，至少有一个芽眼外露。

约经过10~15天，鸡血藤插条就开始生根发芽。因为有地膜覆盖，土壤水分流失很少，故免除浇水灌溉；黑色地膜吸热保温，比用普通方法扦插提前生根发芽5~10天，黑色地膜透光率不足5%，因此杂草不能进行光合作用很难生长，故可免除了前期人工除草。经测算，扦插鸡血藤前期的浇水灌溉、6次人工除草的成本约占全部成本的30%。使用地膜覆盖扦插技术，只需在揭膜后除草1次（节约了5次除草成本），扣除购买地膜成本，比用普通技术扦插育苗节约成本约45%。

4、育苗时间

一般选择2月到5月份之间，最好是清明前后20天左右。此时气温不高，雨水充足，故育苗成活率最高。

5、覆阴浇水管理

扦插后，再往苗床上均匀地喷洒一次水，浇透为宜。然后搭高度为2.5米的荫棚，选用遮光率约60%的遮阳网。嫩苗到10公分时选择阴天的下午喷洒一次叶面肥。90天后，用3%的复合肥喷洒促进嫩苗及根系生长（注意事项：喷洒过后再用清水喷淋一次，避免产生叶面肥药害）。到了六月份以后，气温逐渐升高，泥土里面富集二氧化碳形成淤积，容易引起呕根。要及时把地膜去除，把废弃的地膜集中烧掉以免污染环境。揭膜后，苗床上面的杂草基本上还没有萌发，而此时鸡血藤苗已经开始生长，对杂草已经形成竞争优势。以后视鸡血藤的生长情况人工除草一次或者免于除草，极大地节约了成本。

鸡血藤的养殖方法

鸡血藤幼苗生长缓慢，生长其每10--15天浇稀薄肥水一次。成苗生长健壮。茎蔓右旋缠绕柱状物向上生长。北方于室内越冬。

采收储藏

秋季采收茎藤，除去枝叶，锯成段，晒干。或鲜时切片，晒干。

供应鸡血藤种苗 鸡血藤苗 鸡血藤价格 鸡血藤 鸡血藤种子.电话13978515312