

# 新品种桃树苗嫁接桃树苗批发油桃苗基地

产品名称	新品种桃树苗嫁接桃树苗批发油桃苗基地
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	1.00/棵
规格参数	品种:油桃苗,晚熟桃苗 型号:桃树嫁接苗 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

## 产品详情

泰安盛果源桃树苗基地（18366636868）主要从事桃树苗新品种的推广及繁育工作，年产优质嫁接桃树成品苗300万株，购买盛果源桃树苗的理由：（1）盛果源与您签订正式合同，保证您的合法权益。（2）盛果源农业配送及时分类给客户发货，自建园用量少的朋友我们快递发货，一般1-3天到达。代理商分销商发大货的我们选择汽运，火车给您选择最方便的途径，一般1-2天到达，保证把新鲜的桃树苗快速的发送到您手中。（3）盛果源为您提供桃树苗的管理资料，栽种期间您随时有问题联系我们，我们随时给您处理，让您的种植更无忧。（4）盛果源桃树苗基地宣传力度大，很多客商都主动打电话询问桃子货源，我们可以免费为您们牵线搭桥，让您的桃子有个好销路。栽种桃树苗就选择盛果源这样有实力的基地，选择盛果源，盛果到您园。

盛果源桃树苗基地认为桃树苗本身寿命只有十多年，更新换代快。桃树苗新品种的好坏决定着建园的成败。选择好的品种要注重桃的口感，含糖量高的品种，桃的外观颜色，以新、希、特来刺激消费者的购买。很多朋友问我们什么样的桃树品种是好品种，其实适应市场需求的桃子就是好品种。谁的产品有优势，有特色谁就能取得好的收益。

盛果源桃树苗基地主要桃树苗批发品种有：曦春桃树苗，春晓桃树苗，春丽桃树苗，鲁红618桃树苗，中桃11桃树苗，白如玉桃树苗，夏甜桃树苗，秋雪桃树苗，帅师香桃树苗，秋彤桃树苗，福岛红桃树苗，霞脆桃树苗，突围桃树苗，盛果源黄桃苗：黄金蜜1-4号桃树苗，锦绣黄桃苗，黄金冠桃树苗，金皇后黄桃苗，黄金脆桃树苗，风味皇后桃树苗，风味太后桃树苗，风味天后桃树苗，油蟠5桃树苗，油盘7桃树苗，中蟠11桃树苗，中蟠21桃树苗，瑞蟠21桃树苗，中油19桃树苗，中油21桃树苗，黑桃苗，中华血桃苗等。盛果源桃树苗品种纯，价格低，成活率高，您值得拥有。桃树苗建园要求：1、园地选择：桃宜选择排水良好、土质疏松的沙质壤土，坡向以南坡最好，但忌连作，即已栽过桃树的土地不能再种桃树。2、定植前的改土：定植桃子前一定要进行深翻改土，坡地应改成梯地，增厚土层，然后按株行距挖定植穴或定植沟，穴深、穴宽应有2.5—3尺，每穴至少压足50斤碳基微生物菌肥，分3—4层压，以达到疏松透气，改良土壤理化性状的目的。平坝及粘质土也要改良，实行深沟高厢栽培，排水沟深度在2.5尺以上。厢内按条形沟改土，沟深80CM，沟宽70CM，分三层压入垃圾、渣肥。3、种植时期：春秋均可种植，但以秋植最好，秋植气温高，雨水多，根系损伤后易恢复，来年可减少蹲苗时间，萌芽整齐，10—12月种植恰当。4、栽植密度：一般应根据品种特性、地势、土壤条件、整形方式和栽培方式而定。树势强的品

种可栽稀一些，树势弱的品种可栽密一些；平地比山地栽培距离大；肥沃比瘠薄地栽培距离大；计划密植园比固定种植园栽植密度大；“Y”字型整形的比开心形整形的栽培密度大。一般株行距为3×4米<sup>2</sup>或3×3米<sup>2</sup>，亩栽56株或74株。5、定植：栽植前将伤根和过大的主根修剪一下，然后扶正植株，理伸根系，盖土5-10CM，用脚踏实，在苗木周围培土埂做成圆盘，然后灌透水，待水下渗后盖一层细土，也可再盖一层草，可减少水分蒸发，有利于成活。

桃树苗培育：作为砧木用的幼苗，在苗高25-30厘米时摘心，使苗木增粗，到夏末秋初，可达到嫁接时对砧木需要的粗度。移植宜在早春或秋季落叶后进行。小苗可裸根或沾泥浆移植，大苗移植需带土球。大苗培育需进行整形修剪以构成骨架。桃树般多整成自然杯状形树冠和自然开心形树冠。

嫁接成品桃树苗的栽培：一年生嫁接苗移植后，留主干1米高，剪去顶梢，剪口芽留壮芽。在1米以下的部位不断抽出新枝，可供选择留作主枝。一般在距地面30-40厘米处的新枝留作为第一主枝；在第一主枝上面20-30厘米处，选留新枝作为第二主枝；在1米的地方，即剪口芽抽出的新枝为第三主枝。三大主枝要均匀分布在主干周围，最好不要轮生。夏季修剪时，将主枝上的直立枝、主干上的萌蘖枝和砧木上萌发的砧芽除去，以免影响主枝的生长和早日形成。第二年冬剪时，对各主枝进行短截，剪口芽留壮芽，以培养主枝延长枝。另外在各主枝上选留适合的侧枝。需要注意的是，同级侧枝留在同方向，以免侧枝互相交叉，影响树形和通风透光。

成品桃树苗定干及树冠培养：一年生嫁接苗移植后，先以40-60厘米定干。在定干高度以上的整形带内，一般选3个主枝（少数也有选4个或5个主枝的），主枝的位置分布要均匀，与中心干保持约45°，呈放射状生长。其余的枝条全部除去。第二年冬剪时，将主枝在30-50厘米处短截，为促发侧枝作准备。其他枝条、主干上的萌蘖枝、砧木上的芽也要除去。这样就形成自然开心形冠形了。

桃树苗栽植株行距为4m×5m或3m×4m，每亩55-110株。栽植时期从落叶后至萌芽前均可。桃园不可连作，否则幼树长势明显衰弱、叶片失绿、新根变褐且多分叉、枝干流胶。这种忌连作现象在砂质土或肥力低的上壤表现严重。主要原因是前作残根在土中分解产生苯甲醛和氰酸等有毒物质，抑制、毒害根系，同时还与连作时土壤中的线虫增殖、积累有关。

桃树苗肥水管理：栽后第一年桃树肥水管理：栽后第一年桃树长树成形的关键，在肥水管理上要做到“淡肥勤施”，3—6月，每半月左右施一次刘存寿教授研发的碳基营养微生物菌肥或碳基腐植酸水溶肥，共施8次。栽后第二年及以后的肥水管理：桃树比柑桔、苹果等耐瘠薄，但投产后每年至少应施三次肥。

桃树萌芽肥：施肥量应占全年施肥量的10—20%，应以稀释后的碳基腐植酸水溶肥为主，如果当地属于冬干春旱，桃根就无绝对休眠期，早春萌动需水较多，生长正常树、花芽饱满树应以灌水为主，弱树可适当增施一点谈及营养微生物菌肥，促弱树生长转旺，施肥时间在1月下旬—2月上中旬。

大桃树苗壮果肥：在幼果停止脱落即核硬化前的5月10号以后进行。这次肥料应以碳基腐植酸水溶肥为主，促进果实膨大，促进花芽分化，充实新梢。

大桃树苗采果肥：一般在采果前后施用，其目的是及时恢复树势，促进叶片机能的活跃，增强同化作用，增加养分的积累，提高花芽分化的数量和质量，提高桃树越冬抗寒力。一般早、中熟品种宜在采收后及时施用，晚熟品种在采收前施用，施肥量应占全年施肥量的50—60%，碳基营养微生物菌肥和碳基腐植酸水溶肥配合施，碳基腐植酸水溶肥可进行喷施。

桃树秋施基肥：10—12月施下，以碳基营养微生物菌肥为主，一般按一斤果0.5斤肥的原则施。桃树苗根外追肥：桃盛花初期、幼果期喷碳基腐植酸水溶肥可提高座果率，果实膨大期喷肥可促进果实发育，减少采前落果，采果后喷肥可保叶，推迟落叶期，促进花芽分化。桃树苗施肥方法：土壤施肥方法有环状施肥法、沟状施肥法及穴施法，幼树采用环状施肥法，大面积成年树采用沟状施肥法，山地采用穴施法。一般在树冠滴水线上挖施肥穴。