

极早熟桃树苗嫁接春晓桃树苗口感甜硬度高

产品名称	极早熟桃树苗嫁接春晓桃树苗口感甜硬度高
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	品种:春晓桃树苗 型号:嫁接桃树苗 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

产品详情

极早熟桃树苗嫁接春晓桃树苗口感甜硬度高

买早熟春晓桃苗您不用东奔西跑直接到泰安盛果源农业桃树苗基地来，让您少花钱，买好苗。

春晓桃：生育期65天，6月初成熟，春晓桃比春雪早7—10天 均重220克 特脆甜 有桃香味 自花结果 果重240g 特丰产，平顶，春晓桃全鲜红色，且不老色，肉白色，完熟后略带红色，桃毛极短，底色白，酷似套袋，半离核，硬肉，采下5天，挂树15天都不变软在春美前售完。

每年的八月都成为了桃树管理的旺季。因为这个月份正是大部分仁果类、中晚熟桃及干果类果树果实发育和花芽充实的关键时期。那么，为了保证桃树健壮生长，我们应该如何管理呢？今天小编为大家介绍几个桃树管理的关键点，希望大家能够借鉴。

八月上旬，要做好必要的修剪工作。对辅养枝过多的大树，可疏除部分大枝，以改善通风透光条件、提高花芽质量。对幼树可实行新梢短截和拿枝开角。短截是对非骨干枝的延长头于秋梢基部“戴帽”截，促发二次枝成花；拿枝是对直立旺梢、竞争梢用手拿住其下部反复捏握，勿伤叶片，使枝条组织受损而下垂或呈水平状，抑制顶端生长，促使侧芽萌发成短枝，可于当年或翌年形成花芽。

八月下旬，开始拉枝开角，幼树成形前要坚持每年拉枝。根外追肥八月上旬可喷0.3%~0.5%磷酸二氢钾，促进新梢成熟，10天后再喷1次或喷4%草木灰浸出液3~4次，可增强果实着色和提高含糖量。有苦痘病的园片，八月初连续喷0.5%~1%氯化钙2~3次，以喷果实为主，可增加果肉硬度，提高耐贮性。

及时除草雨后放晴时，及时中耕除草，幼龄园片可进行深耕，深度约20~30厘米，以利于根系生长和彻底清除杂草。

病虫害防治此期应防治好桃小食心虫，当卵果率达0.5%~0.8%时，进行喷药防治。常用药剂有20%灭扫利

乳油2000倍、20%中西杀灭菊酯乳油3000倍、40%水胺硫磷乳剂或青虫菌100倍。喷波尔多液、甲基托布津、多菌灵、退菌特等防治果树叶病虫害。

桃树控旺误区，要科学施肥浇水控制桃树旺长

桃树控旺，很多人都迷信多效唑。不同长势的桃树，使用多效唑就像“救火”一样。火势太大，就要用很多水，火势小，一点点水就能扑灭。在实际生产中，同一个桃园，树势都会有区别，有的树势强，有的树势弱，在使用多效唑进行调控时容易因施用不当造成经济损失。因此，宏祥顺商贸提醒广大桃农，做好桃树肥水调控远胜于使用多效唑。

桃树生长迅速，产量高，只有在良好的营养基础上，才能促进枝叶的正常生长，形成饱满的花芽，为下一年的优质高产奠定基础。所以，每年除了在秋末冬初施一次肥，生长期还要进行两次追肥和叶面喷肥。盛果期大树适当增加施肥量。

桃树新梢旺长难以控制，第一种可能是氮肥施用量过大。有的果农在萌芽前追施尿素，在果实膨大期继续追施高氮复合肥，这是导致旺长的主要原因。另外，还有的果农氮肥用量虽然不大，但树体密闭，只是碳水化合物与氮素失调，旺长现象也严重。桃树旺长难以控制，第二种可能是浇水过多。无水不长树，浇水量越大，旺长越严重。总之，通过科学施肥浇水控制桃树旺长，比单纯使用多效唑要好。