

晚熟黄桃苗新品种桃树苗黄金蜜4号桃苗大果脆甜

产品名称	晚熟黄桃苗新品种桃树苗黄金蜜4号桃苗大果脆甜
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	品种:黄金蜜4号桃苗 类型:嫁接桃树苗 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

产品详情

晚熟黄桃苗新品种桃树苗黄金蜜4号桃苗大果脆甜

栽种黄金蜜4号桃树苗直接就选择泰安盛果源农业，让您省心，省力，省钱。黄金蜜4号桃苗9月中旬熟，果庆双节上市，单果重260--330克，大果400克。大果率高，丰产，自花结果，果实圆形，端正美观。套袋后果实金黄色，不套袋黄红色，果肉金黄，脆，浓甜，含糖16%，有香气，口感极佳，硬度高，挂果20天不软，极耐储运。是难得晚熟桃，经典品种，可大面积发展。

购买盛果源果树苗的理由：

(1) 盛果源与您签订正式买卖合同，保证您的合法权益。路程远的客户我们可以货到付款，合同跟着果苗一块过去。

(2) 盛果源农业果苗配送及时分类给客户发货，自建园用量少的朋友我们快递发货，一般1-3天到达。代理商分销商发大货的我们选择汽运，火车给您选择最方便的途径，一般1-2天到达，保证把新鲜的果树苗快速的发送到您手中。

(3) 盛果源为您提供果树苗的管理资料，栽种期间您随时有问题联系我们，我们随时给您处理，让您的种植更无忧。

(4) 盛果源果树苗基地宣传力度大，很多客商都主动打电话询问各种果品的货源，我们可以免费为您们牵线搭桥，让您的果品有个好销路。栽种果树苗就选择盛果源这样有实力的基地，选择盛果源，盛果到您园。

桃树苗对微量元素肥料的需要量较少，主要靠有机肥和土壤提供，如有机肥施用较多，可不施或少施；有机肥施用较少的可适当施用微量元素肥料。实际的微肥用量以具体的肥料计作基肥施用为：硼砂亩用

量0.25~0.5千克，硫酸锌亩用量2~4千克，硫酸锰亩用量1~2千克，硫酸亚铁亩用量5~10千克（应配合优质的有机肥一起施用，用量比为有机肥与铁肥5：1），微肥也可进行叶面喷施，喷施的浓度根据叶的老化程度控制在0.1%~0.5%，叶嫩时宜稀，叶较老时可浓一些。

疏花疏果

桃树苗座果多，影响树体生长发育，树势衰弱，果实个小，品质降低，并影响花芽分化的数量和质量，因此，在综合管理的前提下，合理疏花疏果成为桃高产、稳产、优质的重要措施之一。

桃树苗疏花：人工疏花，一般在蕾期和花期进行。疏花方法，先疏结果枝基部花，留中、上部花，中、上部则疏双花，留单花。预备枝上的花全部疏掉。

桃树苗疏果：通常在第二次落果后座果相对稳定时进行，在硬核开始时完成。座果过多时，于谢花后1周进行第一次疏果，约留最后应留果量的3倍。早熟品种可以适当早疏，晚熟品种可以适当晚疏。留果量应根据历年产量，当年的生长势，座果情况而定。一般长果枝上大型果留1个，中型果留2个，小型果留4个。中果枝上大型果留1个，中型果留1个，小型果留2个。短枝上大型果不留或2个。预备枝上不留果。

桃树苗疏果方法：人工疏果时，先疏掉萎黄果、小果、畸形果、并生果、病虫果、果枝基部果。疏果顺序按由上而下、由内向外的顺序进行。套袋1.套袋时期：在疏果3-4周后进行，在主要蛀果害虫进果以前完成。套袋前应进行喷药。2.撕袋时期：鲜食用果于采前3-4天，将袋撕开以促进上色。

桃树苗病虫害防治 桃对病虫害虽有较强的抗性，但在花前果后仍时有发生，危害花蕾幼果，造成落花落果现象，必须及时防治。桃植株对药剂颇为敏感，一些渗透性和内吸性强的有机磷药剂不宜使用，因为容易发生药害。

桃树苗鸟羽蛾 又称红丝虫、吊丝虫，危害花及小果。在6—7月繁殖迅速，严重时可使花蕾及小果全部落光。防治方法可用90%的敌百虫800倍液、鱼藤精等相应浓度，在开花前喷药，数天一次，每造花3—5次，至幼果转蒂下垂时才停止。

桃树苗黑点褐卷叶蛾 俗称蛀心虫，以幼虫蛀入果心蛀食果肉，致使落果或使果实失去食用价值。防治方法是要注意清除病果，摘除深埋受害果实；用黑光灯诱杀成虫；用90%的敌百虫喷杀。

桃树苗炭疽病 该病在果园多发生于果实成熟期。贮藏期发病多因伤口诱致，是真菌性病害，受害果实表面有暗褐色圆斑，果肉内部组织腐烂，有酒味。病原菌在烂果内越冬，通过风雨传播，从果实的伤口入侵。防治方法主要做好清园工作，清除并深埋病果落果；采收装运尽量减少果实的机械伤；在病园中喷洒倍量式150倍波尔多液，每隔10—15天一次，连续3—4次。