

梨树苗批发基地晚秋黄梨苗供应

产品名称	梨树苗批发基地晚秋黄梨苗供应
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	规格:1米以上 品种:晚秋黄梨苗 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

产品详情

梨树苗批发基地晚秋黄梨苗供应

晚秋黄梨苗特点：

- 1、早期丰产：矮化密植，每亩栽植160株，单株成年树高度2米左右：一年生树苗便可拔条形成花芽，且挂果集中；三年进入丰产期，亩产达4000斤，四年进入盛果期，亩产超过10000斤。
- 2、容易管理：自花授粉，花期为4月12-14日，无需人工采集异花授粉，10月5日左右为采摘期：抗病能力强，每年只需喷洒5-6次低毒生物农药即可；“两个一次”，每年只剪一次枝，终生只拉一次枝。
- 3、果质极佳：果形扁圆硕大，单果重500-800克，最大可达1800克；皮薄核小，无石细胞，果肉细滑，洁白香甜，果糖含量高达16.8；富含抗氧化物，果实切面15天内不变色、不变质；果皮中有一层薄膜，能够锁住水分不易流失，所以储存期长达6-8个月之久。
- 4、保健功效：施农家肥，喷洒无毒生物农药，保证了绿色食品的起点；富含钙、铁、锌、钾、硒等多种微量元素及维生素B和C、胡萝卜以及苹果酸、柠檬酸等有机酸和果酸，这些成分对于人类非常有益，特别是其所含的天门冬素，对人体健康尤其是肾脏具有特殊的医疗保健功效。

种植梨树苗可不是简单的事情，3年才结果，必须找一家专业可靠的梨树苗基地。泰安盛果源农业全心全意为果农服务繁育的梨树苗，品种纯正，价格低廉，保证成活率，让您的梨树苗种植更有保证。

梨园春季管理要点：1. zhengxing修剪：继续进行梨树的拉枝zhengxing，调节生长，有利于通风透光。2. 施好梨树花前肥：及时施好梨树花前肥，能迅速提高树体营养水平，促壮树势，提高花芽的抗逆性，使其所抽生的新梢和花蕾健壮。花粉活力强，授粉受精好，坐果率高。具体做法如下：

在梨树花芽萌动前，一般在立春前后5-10天，施花前肥，以有机肥和磷肥为主，5年以上的结果树，每株施沤制腐熟的人畜禽粪15 - 20kg，沤制腐熟的花生秧1kg，磷酸二氢钾1.2-2kg。在树冠下挖6-8条深15-20c

m、宽30-40cm，长80-100cm的放射沟，将肥料充分搅拌均匀后，与所挖起的泥土混合，再填回沟内即可，施肥后遇干旱天气，必须每株树淋清水60-80kg，以促进肥料溶解和转化，供根系吸收和利用，提高肥料的吸收利用率。此外，再花蕾期应在叶面喷施2-3次0.1%硫酸镁、0.1%硼砂、0.3%尿素、0.5%磷酸二氢钾混合液。合理间作：梨园中严禁种植高秆作物，只能种植绿肥和矮秆作物（如大豆、绿豆、花生等）。

保花保果：促花促果的根本措施是加强土、肥、水的管理和病虫害防治。另外可采取花期喷0.2% - 0.4%硼砂液或800倍醋精液，放蜂、挂花枝、人工授粉，在雨后舞天摇树，谢花后对旺树，旺枝进行环碗却胧。

病虫害防治：在开花前和谢花后用大生800倍液，仙生600倍液，25%多菌灵300倍液，粉锈灵1500倍液对梨锈病、梨黑心病、梨褐病斑、花腐病进行防治，连续2-3次，每隔10-15天一次。用30%的敌百虫800倍液，2.5%敌杀死3000倍液对梨大食心虫，梨星毛虫、梨茎蜂进行防治；用40%乐果对梨蚜虫进行防治。

丰水梨丰产优质栽培的几项措施：丰水梨是日本的一个优良品种，属砂梨系统。8月下旬成熟，单果重236g，含可溶性固形物14% - 16%，果面黄褐色，果皮薄，果肉白色，汁丰味甜，品质上。丰水梨在费县表现果个大、品质好。果品出口东南亚几个国家和地区，市场供不应求。自1999年对4-5年生的丰水梨改进了栽培管理措施，使平均果重324g，最大果重776g，坐果率提高，含糖量增加；果面橙黄，光滑洁净，果点小而色淡，经济效益显著提高。

秋季修剪：采果后，疏除徒长密挤枝、病枯枝。主干1m以下的低垂枝在1-2年内疏除。疏除主枝、辅养枝外围的大竞争枝。树冠高度控制在3m左右。主枝、辅养枝的角度拉成65°。将冬剪的任务改在秋季完成，以疏剪为主，以利通风透光，增加内膛叶片的光合能力，增加贮藏营养，充实花芽。

叶面喷肥添加杀菌剂保叶：秋剪后，叶面喷施0.3% - 0.5%尿素溶液或0.3%-0.5%磷酸二氢钾铵溶液，对入600倍50%多菌灵液或600-800倍80%大生M-45液，保全叶片，延长叶功能。

秋施梨树专用肥：采果后20天内施基肥，行间开宽1m左右、深40 - 50cm的条沟，每亩施梨树专用复合肥150 - 200kg，土杂肥5000 - 8000kg。黄叶病较重的叶片，每666.7m²施硫酸亚铁15-20kg。施后把肥料与混拌均匀，覆土后灌足水。

早春灌水，延迟开花防冻害：每年丰水梨开花期常有寒流霜冻，致使花器受害，影响坐果率。如果在花芽萌动始期普浇一次水，则可延迟开花3-6天，避开霜冻，提高坐果率。