

玉米蔬菜粘虫青虫可能爆发青虫夜蛾的防治方法

产品名称	玉米蔬菜粘虫青虫可能爆发青虫夜蛾的防治方法
公司名称	海南康拓森生物科技有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:中海润禾 规格:30ml*200瓶 产地:中国郑州
公司地址	海口市坡博路1号虹冠大厦3单元1003室
联系电话	18695805815

产品详情

据全国农技中心病虫害测报处消息，近日，一代粘虫成虫在江淮、黄淮和华北等地虫量突增，江苏姜堰、山东长岛高空测报灯单灯日诱蛾量达上万头；东北地区诱虫量显著高于上年，6月份天气条件总体有利，二代粘虫存在局部暴发的风险。农药助手提醒广大农民朋友，务必注意防范。

一、粘虫的危害

粘虫鳞翅目夜蛾科，又名剃枝虫、五彩虫、行军虫、夜盗虫。是我国玉米等作物上重要的迁飞性害虫，具有杂（广）食性、群聚性、暴食性和迁移性为害特点，前几年在不同区域秋作物造成严重为害。发生严重时，常常在一夜之间把玉米苗吃光，造成缺苗断垄，甚至翻犁复种。

今年一代成虫呈盛期时间早、发生区域广、局部虫

二、粘虫习性及规律

幼虫多在早晚活动，即早晨日出到10点以前和傍晚前后。常常群集迁移危害，故又名“行军虫”。

一、二龄幼虫仅啃食叶肉成天窗，三龄以后沿叶缘蚕食成缺刻，危害严重时吃光大部叶片，只残留很短的中脉；幼虫体色随龄期、密度、食物而变化低龄幼虫取食嫩叶，体色呈绿

色至灰绿色，虫口密度大时，4龄以上幼虫呈黑或灰黑色，老熟幼虫体长38毫米，头黄褐色，有一“八”字纵形。体背有5条纵纹。幼虫受惊有假死和潜入土中的习性。以第二代危害夏玉米为主。

粘虫属中温好湿性昆虫，最适温度19~23℃，最适相对湿度为50~80%。喜食禾本科作物和杂草，食量逐龄增长，五至六龄为暴食阶段。

一般水浇地、前茬小麦多肥密植的田块以及套播田，小麦、玉米共生期长的田块，由于食源充足，温湿度适宜，有利于成虫产卵和幼虫生成虫昼伏夜出，多在小麦中下部枯黄叶尖、叶鞘内产卵，单雌产卵1000—2000粒。

成虫对糖醋液和黑光灯有较强趋性；成虫飞翔能力很强，具有远距离迁飞危害的特性。

三、粘虫防治技术措施

1. 成虫诱杀技术：

(1) 性诱剂。用配置粘虫性诱剂的干式飞蛾诱捕器，每亩1个插杆挂在田间。

(2) 杀虫灯。成虫发生期，田间安置杀虫灯，灯间距100米，晚八点至早五点开灯。集中连片使用防效显著。