

钙果苗培育基地 1年钙果苗 2年钙果苗

产品名称	钙果苗培育基地 1年钙果苗 2年钙果苗
公司名称	绛县古绛镇卫勇苗木经销部
价格	.50/棵
规格参数	
公司地址	山西省运城市绛县古绛镇中杨村
联系电话	13835946276

产品详情

钙果苗培育基地 1年钙果苗 2年钙果苗 3年钙果苗 高产钙果苗.山西运城绛县。马卫勇138-3594-6276.

山西钙果苗种植基地：自产自销1-3年生农大6-10号钙果苗200万株。育苗经验丰富，苗木品种规格齐全。量大价优批发兼零售，自产自销无中介，苗木种子三证齐全、苗木交易受法律保护。提供苗木种植技术、病虫害防治。本苗圃有良种钙果采摘园，欢迎新老客户来电咨询参观订购。1年生钙果苗：苗木高度20-50厘米，苗木地径0.2-0.4厘米。2年生钙果苗：苗木地径0.3-0.6厘米，苗木高度30-70厘米。3年生钙果苗；苗木地径0.4-0.8厘米，苗木高度50-100厘米。

山西绛县古绛镇卫勇苗木经销部：位于山西运城绛县古绛镇，交通便利土地肥沃。集园林绿化用材的生产、销售、售后技术服务于一体。苗圃以科技为先导，以市场为导向，以质为本，恪守“诚信”，建圃10余年来采用公司加农户的形式发展到千余亩。苗木品种规格齐全,为园林绿化单位提供了大批优质苗木,多次得到用苗单位的好评。也产生了良好的经济效益与社会效益，为园林绿化用材的生产与销售作出了重要贡献，欢迎来我场参观考察交流信息，洽谈。

1-3年生钙果苗直销：东北、西北、华南、西南、华北地区。

欧李在世界范围内主要分布于中国北方十三个省、直辖市和自治区，有的地区分布比较集中，有的地区分布则比较零散。

东北地区；东北地区有着广泛的分布。从黑龙江小兴安岭以南一直到河北承德一带、以及内蒙古东部的赤峰、兴安盟都能找到欧李的踪影，主要生长在草原、森林和沙地边缘及一些丘陵区。

西北地区：欧李在西北地区主要分布在陕西和甘肃南部地区。

华东地区：欧李在华东地区主要分布在济南历城区、泰山山脉的万德、北麓涧岭山、长城岭西、卧虎山

华北地区

欧李在华北地区主要分布于山区和陵丘区。山西、内蒙、河南等省、市都有分布，但以山西分布最多，最为集中。山西地处黄土高原，大部分为山区和丘陵区。太行、吕梁、太岳、中条等几大山系，为钙果的生存提供了良好的条件。其次在内蒙古中南部兴安盟一带、河北省北部丰宁县一带、南部太行山一侧、河南伏牛山一带也有较多分布。其他几省如山东，由于地理特点和人为因素，只有零星分布。

华北地区欧李资源主要集中在以下几个区域：

钙果苗北部分布区

主要包括山西北部雁门关外以及内蒙古与山西、河北相临近的一些地区。该区属海河水系，地形复杂，植被稀疏，气候干寒，年均温度低（1—8℃），无霜期较短（120天左右），欧李资源的分布虽较为零散，但主区域呈块状、片状分布如河北丰宁县欧李资源约5300公顷，年产欧李果品120万千克。[5]资源主要特点表现为类群单一，果色、品质相差不大，果个偏小，成熟期较晚。8月中旬果实始熟，果实发育期105天，与东北区表现极为相似。

钙果苗南部分布区

主要包括晋南、晋东南和河南北部及西部部分地区。分布在中条山、太岳山和太行山南段，以三大山系交汇处为最多。该区气候比较温和，无霜期多在180天左右，且地形较为复杂，小气候特别明显，植物种类特别丰富。由于多山地丘陵，人为影响有一定限度，保留了许多珍贵的物种资源，如硬肉类型就在绛县山区被发现。本区欧李资源分布较广，类型多样，特别是优质种源较多，且果熟期较长，从7月上中旬一直到9月下旬都有果熟，是目前发现的欧李资源中最为重要的分布区。其中，太岳山资源最优种群表现为甜度较高，太行山南段资源以酸甜适口或香酸刺激者为上，而中条山优质资源以香味浓郁为最大特点。

钙果苗中部分布区

主要指太行山中中部地区，包括山西阳泉、晋中左权、长治壶关、沁源、黎城及河北东南部分地区，属海河水系，气候温和而干旱，属暖温带半干旱气候区。资源分布面积较大，有较多的优质种源，8月上中旬成熟。

选背风向阳、土层深厚、土壤肥沃的平地或缓坡建园。深翻土壤，每亩施腐熟农家肥2000公斤，把土整碎整平。冬末春初，按株行距1米×1米，挖深、宽各30厘米的定植穴，穴底施垃圾肥、人畜禽粪、过磷酸钙等拌混的有机肥1公斤，上盖一层表土，再将苗放入穴中，然后回填泥土压实。每亩栽660株。

钙果苗管理要点

栽后半个月每天浇水1次，成活率高。在生长期需进行中耕除草2-4次。每年10月，在距树蔸15厘米处打穴，株施腐熟农家肥1公斤。第1次追肥在4月进行，每亩用尿素20公斤对水浇施，以促春梢生长和开花结果，第2次追肥在7月进行，每亩用复合肥20公斤对水浇施，以促果实膨大和提高品质。目前尚未发现病害，虫害主要有蚜虫、食心虫和杏仁蜂等，可喷40%乐果1200倍液防治。

钙果苗整形修剪

采用丛状形或自然开心形。栽后苗高30厘米左右剪枝定干。培养3-4个主枝及大、中、小型结果枝组。对辅养枝、较直立枝和大枝，在夏季进行拉枝以张开角度，增加中、短枝数量。秋季采果后，将过密枝、瘦弱枝、病虫枝剪掉。

钙果收获加工

果期8月初-9月底，单果重6-8克，最重达10克。收获后可出售鲜果，或加工成果汁、果酒、果脯和罐头等。