## 湖北桃树苗批发基地春雪桃树苗基地供应

产品名称	湖北桃树苗批发基地春雪桃树苗基地供应
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	规格:高度80公分以上 品种:春雪桃树苗 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

## 产品详情

湖北桃树苗批发基地春雪桃树苗基地供应

## 简介:

泰安盛果源农业为您提供湖北桃树苗批发基地春雪桃树苗基地供应信息,很高兴您能浏览到我们公司春 雪桃树苗出售信息,希望能对您有所帮助,如有什么不明白,请联系盛果源农业我们将竭诚为您服务。

春雪桃树苗:春雪桃树苗:由美国引进的全红、早熟毛桃品种,属于优良的二代硬肉有毛品种,肉质硬脆,风味甘甜。果实圆形,大果型,平均单果重200克,大果重366克。缝合线浅,茸毛短而稀,两半较对称。果皮全面浓红色,内堂遮阴果也着全红色。果皮不易剥离。果肉白色,肉质硬脆,纤维少,风味甜、香气浓,粘核。可溶性固形物含量16%,品质上、不落果。果实耐储运,常温下储存期10天,0 条件下可贮存62天以上。

盛果源农业其他桃树苗品种推荐:

黑桃桃树苗:黑桃,也叫黑桃皇后,原产于浙西山区,是我国近年发现的最具有开发价值的特种桃品种。9月上旬成熟。外形如普通桃,果形较大。一般单果重120-160克,最大单果重达245克。果实成熟时深紫红色,黑里透红,外观十分诱人。果肉紫黑色有红线,是目前世界上唯一的黑肉桃品种。

突围桃树苗:单果重量219克,大果486克以上,成熟上市与众不同,全红在同期成熟桃中着色好,背阳面乳白色,成熟全面乳红,如同套袋桃,亮丽鲜红,果形漂亮,平顶中桩,馒头形,硬溶质,全红,成熟期甜度可达16.8%,口感甜蜜。无论挂树还是采摘后均可放置7天以上不腐不烂,成熟时间好,露地6月12日成熟,同中油4号,在加纳岩之前果实售完,优质浓甜,无酸味,吃了此桃才真正感到真正的桃子味道,自花授粉,花粉量大,极丰产,纵观东西南北各地毛桃、油桃、蟠桃、大棚桃还是露地桃,还是早

中晚熟桃相比,只有栽突围桃才是稳、准、高的选择。

映霜红桃树苗:冬季成熟、春节上市的极晚熟桃新品种。此桃具有晚熟、耐藏、个大、优质、丰产、效益高等特点,但是裂果严重,无法克服。成熟期9月底;单果重216.5克,大果425克;果面着鲜艳的玫瑰红色,光彩亮丽,极其漂亮。含糖18.1%,高达26%。果肉脆甜可口,清香宜人,风味极佳,品质超群;丰产性特强,亩产万斤,亩收入二万元以上。

永莲蜜桃树苗:永莲蜜桃果实极大,属于大型果,平均单果重420克,大果重700克,果实圆,果面平或微凹,缝合浅,左右对称,果面平滑,着色度80%为红色,完全成熟时果皮易剥离,果肉白色,无红色素,粘核,硬溶质,精纤维少,肉质细腻,风味香甜,可溶性固形物17.9% - 22%,在室温下可存放15天以上,原口味不变,同时耐瘠薄,早结果,丰产性高,成熟季节正值国庆,仲秋佳节,市场潜力大,从而填补了此时期市场缺桃的空白,因此,经济价值较高,从而深受广大消费者和栽培者的青睐,是当前适应产业结构调整,提高农民增加经济收的新途径。

金秋红蜜桃树苗:金秋红蜜桃属于晚熟优良桃品种,平均单果重285g,大果重600g,该品种着色好、糖度高、品质优、耐贮、商品性好、丰产稳产,果实发育期175天,山东泰安地区在9月底10月中旬成熟,比冬桃早熟约15天。果实圆形,缝合线较明显,果顶略突起;果个大,大小均匀;果皮中厚,不易剥离,成熟时果实底色乳白色,套袋果70%以上着红色,果面茸毛稀、短,果实成熟后散发出浓郁香味;果肉乳白色,粘核,近核处有红晕,肉质细密、硬、脆,味甘甜,可溶性固性物含量15%~20%,高达25.5%。品质上,耐储运,货架期长。金秋红蜜桃适应性强,在泰安、青岛等不同立地条件下栽培,均表现出良好适应性,耐瘠薄,树体生长良好,生长量大,扩冠成形快。在受冷寒的情况下仍能坐果。抗褐腐病、疮痂病和细菌性穿孔病,抗寒,耐旱。

中华寿桃树苗:中华寿桃是从中国北方冬桃自然芽变中选育出的新品种。中华寿桃是发展绿色食品和出口创汇的优良品种,在各地该品种综合性状表现较好。该桃为我国特有,在发展我国特色优质水果,开拓国内外果品市场方面具有极其重要的意义。个头大。大果可达1000g以上,多数均在500-700g之间。品质好。色泽美,成熟后的大桃颜色鲜红,格外漂亮诱人。成熟后外形美观,果肉软硬适度、汁多如蜜。食后清香爽口,风味独特。含糖量可达18%-20%,并含有许多人体所必需的维生素及氨基酸等。该桃属极晚熟品种,在桃果市场淡季之际,于10月初陆续到11月收获,具有极大的市场潜力。极丰产。贮藏期长。此果可自然存放1个月,若不碰不压没伤痕,又有冷藏设备,可储藏到春节,果面仍鲜红艳丽,不变质。

秋彤桃树苗:美国品种,中秋节前成熟大果型离核桃, 成熟期8月中下旬到9月上旬,挂树到9月中旬还有果在树上,果重 250~550克,特大

成熟期8月中下旬到9月上旬,挂树到9月中旬还有果在树上,果重 250~550克,特大果可以达到1.8斤一个果,白肉离核,浓红,平顶圆形,浓甜味香,光洁稀毛,不用套袋,成花快,花粉多,极丰产。

桃树虽较耐干旱,只要土壤含水量达20%,就能正常生长,但幼果对水分要求十分敏感,水分不足就会脱落。特别是开花前后,生长需要一定的水分,在沙土地栽植的桃树,更需要及时浇水,花后及果实迅速生长期,如果水分不足,影响果实发育,引起大量落果。若花期水分过多,要及时排水,如果湿度太大、光照不好的话,花粉吸水膨胀破裂失活,影响受精,也会引起严重的落花落果现象。

幼果前期发育所需要的养分主要依靠树体内贮藏的养分。上一年管理好,秋施基肥及时充足,则叶片保护完好,树体贮藏养分充足。而上一年管理粗放,秋季末施基肥或施肥很晚,叶片脱落早,树体贮藏养分极少。因缺肥、养分分配不合理,致花芽分化质量差,不能着果或因追肥过多、营养生长过旺,而抑制新梢措施不力,都会引起落花落果。

桃流胶病、桃蚜等。主要害虫是蚜虫桃瘤蚜,为害最严重的时期在花期及落花后,花期蚜虫在粤筒内为害子房,落花后为害幼果。蚜虫为害后周幼果脱落,即使不脱落,也无商品价值。

秋季果实采收后,加强肥水管理,除治病虫害,减少落叶,改善树体营养条件,促进花芽分化,提高花芽的质量,对因雌蕊发育不完全造成的落果是行之有效的办法。至于对缺乏授粉的品种,则应配置授粉树,或采用果园放蜂和人工授粉。这些都是防止前期落果的有效措施。