

布鲁克斯樱桃苗基地布鲁克斯樱桃苗批发

产品名称	布鲁克斯樱桃苗基地布鲁克斯樱桃苗批发
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	10.00/棵
规格参数	规格:高度80公分以上 品种:布鲁克斯樱桃苗 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

产品详情

【布鲁克斯樱桃】:布鲁克斯在山东省泰安地区3月23日花芽膨大，4月9日盛花，花期与对照品种红灯一致；果实5月18日成熟，果实发育期39天，比对照品种红灯晚熟3天，比早大果晚熟6天，比美早早熟4天[4]。布鲁克斯果实成熟集中，采收期比红灯短3天。需冷量680小时，明显少于红灯，保护地栽培时，可比红灯提前扣棚升温，提早成熟上市。虽然露地栽培时布鲁克斯比红灯晚熟3天，但同棚保护地栽培时，布鲁克斯与红灯同期成熟。布鲁克斯4月11日展叶，11月下旬落叶，年营养生长期220天左右。

大樱桃易出现多头枝，应重视新梢的摘心工作。5月上中旬，留一个单轴延伸，一两个留8—10片叶摘心，多余的去掉。主枝中后部生长势强的新梢适当摘心，削弱生长势，培养成中型结果枝组，过密的新梢要适当疏除；多头枝冬剪时单轴延伸，一个留1个叶芽短截，多余的疏除。

大樱桃果实采收后修剪。6月下旬7月上中旬，对过密的大枝适当疏除，这时伤口愈合快，改善通风透光。主干上一次疏大枝不要过多，1—2个为宜，逐年进行；主枝上的竞争枝，霸王枝要及时疏除，均衡树势，改善风光条件。

在幼树上效果显著，主干上适当刻芽可以提高成枝率，增加主枝数量，多长枝，快成形；主枝中后部刻芽能够增加结果部位，减轻内部光秃，利于早期丰产；结果大树的光秃带重刻芽，刺激阴芽萌发，增加结果枝组。

幼树中干延长枝适当短截，促发分枝，增加主枝的数量；对竞争枝和强旺枝可留芽极重短截，以粗换细，均衡生长势。

大樱桃结果树成花容易，树势易衰弱，冬剪适当疏除弱的结果枝，减少花芽数量；部分结果枝及时回缩

更新，配合肥水管理，复壮树势。

大樱桃花芽差异大，弱花芽易死亡，修剪上采用压低背上促两侧的方法，背上留橛不超过15公分；结果枝短截要留叶芽，以防枯死。

大樱桃修剪手法，综合运用刻、摘、拉、疏、甩、截、缩等方法，使枝条均衡分布，通风透光，树体结构合理，达到健壮树势的目的。

樱桃红颈天牛主要以幼虫在枝干内部蛀食为害，导致树干的输导组织被破坏，树势被削弱，造成流胶，严重时造成大枝或全树死亡，给樱桃生产带来了极大的为害。

幼虫蛀食皮层与木质部，喜于韧皮部和木质部间蛀食，向下蛀隧道弯曲，内有粪屑，长达50~60cm，隔一定距离向外蛀1排粪孔，致树势衰弱或枯死。

樱桃生产主要病害都有哪些，如何预防和判断，果农们怎么正确用药，针对这些农民关注的问题集中咨询了我院樱桃专家。专家总结了以下四种常见病害的预防和治疗方法，供广大果农参考。