

萨米脱樱桃苗基地萨米脱樱桃苗批发

产品名称	萨米脱樱桃苗基地萨米脱樱桃苗批发
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	10.00/棵
规格参数	规格:高度80公分以上 品种:萨米脱樱桃苗 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

产品详情

【萨米脱樱桃苗—沙蜜豆樱桃苗】:加拿大育成的中晚熟大粒品种。树势强健，丰产性能极好，亩产可达2500公斤。初果期多以中、长果枝结果，盛果期以花束状果枝结果为主。萌芽率高，成枝力强，果个大，平均单果重11-13克；果，实心脏形，稍长；果皮薄而韧，紫红色，充分成熟紫黑色，有光泽；肉质硬，含可溶性固形物17.9%，糖度14.6%，总酸0.78%，酸味少，风味浓，品质佳。6月中下旬成熟，比那翁品种晚2-3天。采前遇雨裂果较多。萨米脱，果个大。色紫红，肉质硬，品质佳，极丰产，是一个很有希望的丰产品种，可推广发展。

从大樱桃落花后10天幼果开始发病，果面上形成浅褐色圆形小斑点，逐渐扩大为黑褐色病斑，幼果不软腐；成熟果发病，初期在果面产生浅褐色小斑点，迅速扩大，引起全果软腐。病果少数脱落，大部分腐烂失水，干缩成褐色僵果悬挂在树上。嫩叶受害后变褐色萎蔫，枝条受害一般由病花柄、叶柄蔓延到枝条发病，病斑发生溃疡，灰褐色，边缘绿紫褐色，初期易流胶。病斑绕枝条腐烂一周后，枝条枯死。侵染规律：该病是一种真菌病害，一般在僵果和枝条的病部组织上越冬，春季借助风雨和昆虫进行传播，由气孔、皮孔、伤口处侵入。花期遇阴雨天气，容易产生花腐；果实成熟期多雨，发病严重。晚秋季节容易在枝条上发生溃疡。自开花到成熟期间都能发病。褐腐病防治方法：果实采收后，彻底清洁果园，将落叶、落果和树上残留的病果深埋或烧毁，同时剪除病枝及时烧掉。合理修剪，使树冠具有良好的通风透光条件。发芽前后喷1次5~10波美度石硫合剂；落花后及时喷杀菌剂，之后每隔10天左右喷一次，连续2~3次。药剂可用24%咪苯唑4000倍或20%安泰生1000倍或70%代森锰锌600倍液或50%甲基托布津600~800倍液，均可有效防治褐腐病。樱桃炭疽病常造成早期落叶和果实腐烂，影响树体生长、果实产量和品质。危害症状：侵害叶片、新梢和果实。幼果受害，初为淡褐色水渍状斑，后随果实膨大呈圆形或椭圆形，红褐色，中心凹陷；气候潮湿时，在病部长出橘红色小粒点，幼果染病后即停止生长，形成早期落果；气候干燥时，形成僵果；成熟果的病斑中呈明显的同心环状皱缩，叶片病斑圆形或不规则，淡褐色，病、健部界限明显，后期病斑为灰褐色，干枯脱落，造成穿孔。新梢上的病斑呈长椭圆形，暗褐色，稍凹陷，病梢上叶片呈上卷状，严重时枝梢常枯死。