特早熟惊夏油桃苗批发盛果源桃树苗基地

产品名称	特早熟惊夏油桃苗批发盛果源桃树苗基地
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	规格:高度80公分以上 品种:惊夏油桃苗 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

产品详情

特早熟惊夏油桃苗批发盛果源桃树苗基地

泰安盛果源农业桃树苗基地为您推荐：特早熟惊夏油桃苗

惊夏油桃苗为中油4号芽变品种，果实近圆形，表面光洁，颜色亮丽，粘核，平均单果重169g,可溶性固形物含量13.59%,果实去皮硬度7.8kg/cm²。惊夏油桃苗花期比“ 中油4号 ”迟2天，但果实成熟期比“ 中油4号 ”提前15～18天，丰产性好，适应性强。

桃树的病虫害较多。主要病害有桃缩叶病、性穿孔病、果实炭疽病、疮痂病、褐腐病及枝干流胶病等。主要害虫有红颈天牛、桃蛀螟、梨小食心虫、桃蚜、桑白蚁、叶蝉和刺蛾等。

桃的4种病害：桃缩叶病病菌在芽鳞和树皮上越冬，早春展叶前后侵害叶片、新梢，使其变形、干枯、脱落，也可为害果实。防治方法是在桃芽膨大而尚未绽开时喷布波美5度石硫合剂，严重时在展叶后再喷0.3度石流合剂，同时结合人工及时摘除病叶、病梢烧毁，减少病源。性穿孔病多在春夏之际发生，造成叶片穿孔、脱落。防治方法：在早春萌芽时(露绿期)喷布1：1：100倍的波尔多液。喷药时需注意与石疏合剂的喷药期之间有7-10天间隔期，且在展叶后宜改喷65％代森锌400-500倍液防治，以免产生药害。桃炭疽病为害果实和枝稍，4-7月间均能发生，花后连阴雨天气易造成该病暴发。可结合对挑缩叶病和桃疮痂病的喷药进行防治。桃疮痂病主要为害果实，幼果期喷波美0.3-0.4度石硫合剂，或25％多菌灵400-500倍液，或75％托布津1000倍液，均能有效地防治该病。

桃流胶病：是真菌侵染和生理性原因共同造成的一种病害，主要为害主干和主枝，引起流胶，削弱树势。土壤粘重，氮肥过多，连作重茬，排水不良，夏季重修剪，以及虫害伤口等都能加剧流胶。防治方法

：主要从加强管理，增强树势入手，做好树体保护工作。

红颈天牛：以幼虫在树干蛀道内越冬，为害主干及根颈部，削弱树势或引起死树。防治方法：可在5月下旬成虫产卵前对主干及主枝分杈部位涂白(涂白剂用生石灰和水按1：3-5比例调制而成，加入少量食盐可增加粘着作用，加入少量石硫合剂渣滓可提高防虫效果)，减少产卵。同时人工捕杀成虫。在生长期经常检查树干，发现幼虫为害时可行钩杀或药杀。