

## 半夏块茎腐烂，病害高发期不能漏下的防治措施

产品名称	半夏块茎腐烂，病害高发期不能漏下的防治措施
公司名称	潍坊奥丰作物病植保服务有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	规格:500毫升 用途:杀菌剂 作用范围:果树、蔬菜、中药材病害防治
公司地址	寒亭区北海工业园起步区
联系电话	18815361503 15621612561

### 产品详情

#### 半夏块茎腐烂，病害高发期不能漏下的防治措施

半夏生长到了8~10月份，也就是进入了霉雨季节，早春种植的半夏形成的二代、三代、四代珠芽和夏季栽培的半夏形成的一代、二代珠芽迅速膨大，形成了块茎，栽培时做种的小母茎也在自身膨大。此期是半夏块茎生长最快的阶段，也是半夏块茎抵御外界侵染能力最弱的时期，块茎越大，抵抗力越弱，块茎越小和珠芽防御能力越强。

**病因症状：**此病在高温、雨季、土壤湿度长时间过大、块茎和珠芽的膨大期发生。病菌侵染半夏块茎的初期，块茎的周边出现不规则的黑色斑点，此斑点向四周迅速扩展，3-4天后，众多的病菌斑点联在一起，继续向块茎内部侵染，此时，半夏根系开始萎缩，地上部的叶片逐渐由绿色变黄、枯萎。一周后，半夏块茎呈圆水泡状，好似熟透了的葡萄，块茎内全是黑水，全株死亡，最后只剩下薄薄的外皮。此病害也是目前人工栽培半夏最常见、难治疗、危害大、范围广的病害。

出苗后叶片喷雾。《青枯立克》300倍+《沃丰素》600倍叶面喷雾，喷雾3-4次，药液能被叶片吸收向下传导至块茎，可修复伤口，补充营养，杀灭菌源。

在块茎膨大期前或梅雨季节来临前用《青枯立克》+《沃丰素》+《地力旺》喷雾配合灌根，块茎膨大期是用药关键期，此时期抵抗力弱，极易上腐烂病。此时用药，首先杀菌，其次能够及时补充膨大期所需营养，另外施用《地力旺》增加土壤有益菌数量，活化土壤，土壤疏松透气，提高土壤肥力。

遇到连阴雨天气和土壤较湿润时，只要能下田中耕，要进行多种形式、多次的中耕松土，以打破土壤的板结层，使土壤中的有害气体排除，空气中的新鲜氧气进入，增加土壤和空气中的气体交换，这一措施，可有效预防和减轻腐烂病的发生。并及时追施青枯立克杀菌剂跟微生物菌剂奥农乐，解决土壤透气性，板结、酸化等问题，还能将病菌杀死在摇篮中。

烂茎抢收。半夏生长的中后期，如遇到连阴雨天气和土壤湿度较大时，要勤检查半夏生长情况，如发现有一部分半夏植株发生腐烂病，遇此情况，不管是否到刨收季节，均应及时果断抢收，不可拖延时日，否则，块茎腐烂很快，先烂大的，后烂小的，造成减产甚至绝产。