

番茄青枯病溃疡病髓部坏死等细菌性病害的防治青枯立克杀菌剂500m

|

产品名称	番茄青枯病溃疡病髓部坏死等细菌性病害的防治青枯立克杀菌剂500ml
公司名称	沧州正兴生物农药有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	品牌:奥立克 形状:液体 产地:山东潍坊
公司地址	献县河街镇后沿
联系电话	15725679778

产品详情

番茄青枯病主要在结果期开始发病。主要症状：初发时上部叶片萎蔫，继而下部叶片萎蔫，最后中部叶片萎蔫；初时白天萎蔫夜晚恢复，2-3天后不再恢复，植株枯萎死亡，但植株仍保持绿色，切开茎部，维管束变褐，用手挤压，有乳白色黏液渗出。这是青枯病的典型症状，有这些症状的即青枯病。

青枯病病原菌属细菌，病菌随病残体在土壤中越冬，借雨水和灌溉水传播，发病最适宜温度为25 -37，土壤含水量大于25%时，有利于病菌侵入，高温、高湿时为害严重，此外连作、低洼地、排水不良、土壤缺钙缺磷，均有利于该病害流行。

番茄溃疡病多成株染病，发病初期下部叶片向上纵卷，凋萎下垂，部分植株出现萎蔫，后期病叶叶缘枯黄，叶脉间变黄，全叶变褐枯萎，但不脱落。茎部受害，生狭长条斑，扩展迅速，后期病斑开裂，茎秆增粗，产生大量气生根，髓部中空腐烂，有臭味散出，严重时植株枯死。

溃疡病病原菌属细菌，病菌最适宜生育温度为25 -29，高温、高湿、连作、排水不良利用该病流行。

番茄细菌性髓部坏死，近几年发生严重，初发病时嫩叶褪绿，严重时植株上部叶片萎蔫，下部茎坏死，病茎变硬，表面生有黑色或褐色斑，纵剖病茎，髓部变褐色坏死，坏死部位多发生不定根，严重时植株枯萎死亡。

髓部坏死病原菌属细菌，多在第一穗果膨大变绿的绿果期发病，栽植过密，光照不足，氮肥施用偏多，湿度高发病严重。

综合防治措施：

1、基肥使用：

a.用料及用量（亩用量）：

奥农乐50-100公斤

地力旺生物菌剂，5-10瓶

作物秸秆、农家肥、有机肥、化肥，根据土壤情况酌情使用

b.使用方法：

将奥农乐、农家肥、有机肥、化肥秸秆均匀的撒施于地表，地力旺稀释后喷施，然后深翻（设施的翻25厘米；露天的翻30厘米）之后旋耕（15-20厘米）

2、定植

苗处理，用青枯立克150倍+地力旺200-300倍蘸根或泡盘。

3、定植后

灌定植水，按每亩地，青枯立克5-7瓶+地力旺5-10瓶冲施或滴灌1-2次；或者采用青枯立克150-300倍+地力旺300-500倍灌根。

4、缓苗后、苗期

青枯立克200-300倍+地力旺500-600倍喷雾2-3次，间隔7-10天，其中一次复配沃丰素600倍；可同时用青枯立克150-300倍+地力旺500倍灌根1-2次。

5、花果期

青枯立克150-300倍+地力旺500-600倍，每隔7-10天喷雾一次，其中复配沃丰素600倍1-2次；可同时用青枯立克150-300倍+地力旺300-500倍灌根1-2次；病害高发期用青枯立克复配大蒜油1000-1500倍或其它化学药喷雾。

备注：如浇水，请于浇水前1-2天喷雾用药。

发现病情后，对病株及病株周边的地块用青枯立克90-150倍+大蒜油1000-1500倍进行喷雾+灌根，连用2-3次，间隔3-5天，（根据病情，青枯立克的喷雾可提到1天喷1次，连续喷雾2-3天）；病情严重的可复配其它化学药。

灌根区域：新棚区发现死棵，重点灌得病行和临近得病行的4-6行。老棚区因重茬严重，病原菌多，建议全部灌根2次。