

# 裸根占地桃树=8公分-10公分-12公分桃树价格

产品名称	裸根占地桃树=8公分-10公分-12公分桃树价格
公司名称	绛县泽森苗木种植专业合作社
价格	8.00/棵
规格参数	
公司地址	山西省运城市绛县古绛镇中杨村104号
联系电话	13903486159 13903486279

## 产品详情

供应3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15公分占地桃树 省级示范单位【山西泽森苗木合作社】 大量供应嫁接桃树苗、晚熟桃树苗；红不软桃树苗，冬雪王桃苗、映霜红桃树苗、秋彤桃树苗、水蜜桃苗、黄桃苗、蟠桃苗、油桃苗、油蟠桃苗、巨蟠桃苗、岱妃桃苗、玉妃桃苗等优质嫁接桃树苗、2公分至10公分桃树、占地大桃树现货供应！根据桃树的需肥规律科学合理施肥，桃树生长对氮、磷、钾、钙、镁的需求比例约为1:0.4:1.4:1.6:0.3，因此，施肥的种类、时间、方法是：

1. 9月上中旬施入充分腐熟的优质土杂有机肥3500~4000kg，可混加少量复合肥，施肥后浇大水。由于桃果的成熟期短，足量的基肥即能保证生长期一大半的营养，且肥效长而柔和，不易促发旺条。来年3月上旬尽早追施钙肥，施肥后浇水。

2. 桃子成熟前20~30天追施高氮高钾型硫酸钾复合肥促进果实膨大，亩产4000kg桃子可施用山东省土壤肥料总站测土配方项目工程肥“金兴”测土配方果树专用肥（氮、磷、钾比例：16~10~16）75kg左右，施肥后浇中水。

3. 采用放射状开沟施肥。在树冠下距中干80cm左右向外开沟，沟的条数4~6条，内容外宽，内浅外深，一般深20~30cm，宽30~50cm，长60~80cm，施肥后要和土拌匀，可使肥分深至30~40cm，覆土后浇水。这种施肥方法伤根少，能促进根系吸收。再次施肥时，沟的位置应错开。这样自然生长为浅根系的桃树的根系最佳生长空间扩大，从而大大提高树体的抗逆性。

### （三）浇水与排水

除了结合施肥浇水外，还要注意在花后15~20天浇一次小水，以减少生理落果，在11月下旬灌足封冻水。进入雨季，降雨多时，及时排水防涝。

## 二、病虫害防治

（一）清除越冬菌源。3月15日前，剪除病枝，清除落叶、杂草、病虫果、僵果、果核等，集中深埋或烧毁。进行树干、主枝、大锯口涂白（涂白剂：水30份；生石灰8份；食盐2份；石硫合剂原液1.5份；植物油0.2份）。

(二) 芽萌动期喷3~5波美度石硫合剂，防治多种病害和蚧壳虫等，花芽露红前结束。

(三) 谢花后立即喷内吸性杀菌剂混加杀虫剂，杀菌剂可选用甲基托布津、甲基纯白托（华阳农药）、多菌灵等，防治细菌性穿孔病，应选用专门防治细菌病害的药剂如20%龙克菌（噻菌铜）可湿性粉剂、20%叶枯唑（噻枯唑）可湿性粉剂、20%噻唑锌可湿性粉剂、20%噻森铜悬浮剂、12.5%绿乳铜（松脂酸铜）乳油等，杀虫剂选用吡虫啉和灭幼脲3号（吉林通化），防治多种桃树病害和桃蚜、桃潜叶蛾等。

(四) 间隔10天左右喷布保护性杀菌剂，如安泰生、大生、喷克等+阿维灭幼脲。

(五) 7~10天后喷布内吸性杀菌剂混加杀虫剂，如井冈霉素多菌灵+灭幼脲3号。

(六) 间隔10天左右喷硫酸锌石灰液(硫酸锌0.5kg、消石灰2kg、水120kg)

(七) 间隔15~20天喷布一次多菌灵加灭幼脲3号。

(八) 间隔10天左右喷一次锌灰液。

以上喷药应视天气情况、实际病虫害发生情况适当增减，且要内吸与保护交替进行，采收前一个月应停止用药。

### 三、花果管理

(一) 要进行花前复剪。

(二) 花期授粉。采用壁蜂授粉和人工授粉（用鸡毛掸子从授粉树上蘸取花粉授给要授粉的树）结合进行，确保坐果。

(三) 疏果。谢花后20天左右已能分辨出果实的大小时进行第一次疏果，要疏掉发育不良果和畸形果、着生直立的果和个别大果、小果，留生长比较均匀的果。第二次疏果在谢花后5~6周进行，先疏早熟品种、大果型品种，坐果率高的品种和盛果期的树；第二次生理落果结束迟的品种应晚疏。

(四) 套袋。疏果结束后进行全树套袋，要选用中高档纸袋，套袋前浇水、喷药。

### 四、整形修剪

冬季修剪和夏季修剪结合进行，以疏除强旺生长点为主。应重视夏季修剪，依枝梢的疏密采取抹芽、摘心、捋枝、疏枝、拉枝开角等相应的手段，注意选留枝组的更新枝。冬季修剪以疏、甩为主，实行单枝甩放更新法。