

核桃苗价格==核桃苗价格

产品名称	核桃苗价格==核桃苗价格
公司名称	绛县义隆苗木专业合作社
价格	6.00/棵
规格参数	
公司地址	山西省运城市绛县古绛镇峪南村161号
联系电话	15934441177

产品详情

核桃苗 核桃苗价格==核桃苗价格 1年核桃苗价格 2年核桃苗价格 3年核桃苗价格 核桃苗多少钱一棵 2年核桃苗多少钱一棵？山西核桃苗基地 出售1年优质嫁接核桃苗500万棵 2年优质嫁接薄皮核桃苗100万棵 亩栽60棵核桃苗 一棵6元 正宗嫁接薄皮核桃苗基地 春季和秋季，均为栽植核桃苗的好季节。春栽多在土壤解冻后至萌芽前进行；秋栽多在立秋以后至地面上冻以前栽植(土壤表面不上冻的地方，从立秋后10月至次年的4月中旬均可。

(1) 播种

8~9月果熟后采种，脱皮、晾干、干藏。3月中旬将种子用冷水浸泡2~3天，捞出后混湿沙，堆于向阳处。高30~35cm，上面盖10cm厚的湿沙，每天洒水1次保持湿润，晚间盖草帘或薄膜保湿保温，10~15天果壳开裂、露白即可播种。每天挑选1次，分批播种，播种时应足墒播种。

先按行距40~50cm开沟，株距按15~20cm点播，点播时两条合缝线平行于地面，深度以果上距地表3~5cm为宜，覆土后压实保墒，播种量100kg/亩左右，产苗量7000~8000株/亩。

(2) 嫁接

嫁接在3月下旬至4月上旬进行。首先采集接穗，3月中旬在芽即将萌动时，采集生长健壮、无病虫害的1年生枝作接穗，采后分品种进行湿沙贮藏，4月上旬待核桃砧木芽萌动开始嫁接。砧木要求粗度在1.5cm左右，距地面10cm处进行嫁接。

核桃嫁接时有伤流，不易成活，嫁接前12小时内必须在根际部刻伤至木质部“放水”，再行劈接或插皮

接，接后用塑料条绑紧伤口，接穗上端用漆涂抹防止水分蒸发。成活后及时除萌松绑，松绑时间以新梢生长20cm以上时进行为宜。待嫁接苗长至40cm左右时，用小竹杆或木棍固定，以防风折。

(3) 种植管理

栽植时间在3月下旬萌芽前后，栽植1~2年生苗木成活率高，栽后应浇透水，并加强水肥管理，经常松土除草，雨季注意排水，在6-7月注意防治病虫害。生长期应进行修枝，干高保持在3m以上。落叶后不可剪枝，否则易造成伤流，影响树木长势。

栽植时间落叶果树一般以冬季为宜，常绿果树以春季为宜，定植时要做到规格化，达到横竖成行。定植时嫁接口应露在地面，根系要伸展，然后培土、踏实、灌水，水渗后再封穴，以利保水。分散树体高大核桃树寿命长，上百年的大树仍能保持较高的产量。树体高大、枝粗叶茂，一株大核桃树的冠径可达10余米，占地面积100~200平方米。

一亩地能种植多少株核桃苗

针对几个地形给大家简单介绍一下：首先分为老品种核桃苗还是新品种核桃苗。老品种核桃苗树冠比较大、发枝力非常强，结果枝叶长，占地面积大，平原来说的话，一亩地栽植30株左右。山地的话，老品种一亩地栽植最多40株核桃苗。因为老品种核桃苗的特性，决定了一亩地栽植数量受限。

新品种核桃苗最大的特点就是树冠小、矮化、结果枝短而紧凑。根据核桃苗的采光度、透风度、效益最大化来定：平原：比较平坦的地貌，一亩地栽植56株，行距和株距4米*3米，这是平原合理栽植的株数。山地来说的话，有一定的坡度，坡度在45度以上的话，就可按山地来栽植，山地一亩地栽植75株，行距和株距3米*3米。山地一定的坡度，相对而言水肥不是特别好，树冠长不了太大，山地有一定坡度，透光、透光效果更好。栽植密度相对平原多一些。但是每个地区不一样，地势也是不一样的，栽植的数量也有一定区别，主要看地势。

核桃苗多少钱一株

目前根据最新市场价格，桃实生苗30公分以下的1.3元，30-45公分的1.6元，50-75公分的2元。0.8-1.2米的3元。1.3-1.8米的4元，1.8-2.5米的5-10元。嫁接堡核桃苗30公分以下的2元，30-45公分的5元，50-75公分的6元。0.8-1.2米的7元，1.3-2米的8-10元。

核桃树寿命

核桃树寿命为几百年，丰产期从第三年开始第五年进入盛产期，一直将持续三百年以上早实核桃树品种一般是一至三年挂果,如云新系列(比如云新14号),新疆核桃(新疆1号、2号),漾江1号；三至五年挂果的有漾潭泡核桃；还有5至8年挂果的晚实核桃，然后就是8年后挂果的晚实核桃，比如美国山核桃。总的说来品种不同挂果周期不同,气候管理方法不同也会影响挂果时间。

核桃稳产丰收的关键是实施科学有效的病虫害防治，而4--7月份是病虫害防治的主要时期。时下，核桃树的病虫害防治也随之进入关键时期，这个时期的病虫害防治容不得半点马虎。那么，这一时期核桃树的病虫害防治都有哪些技术要点呢？

病虫害防治。石硫合剂既有杀菌作用也有杀虫作用，萌芽前要给核桃树喷3到5波美度石硫合剂，可预防腐烂病、炭疽病以及介壳虫类、金龟子等病虫害，还可预防倒春寒对核桃树造成的冻害。萌芽前喷石硫合剂对全年的病虫害防治都有一个重要的作用。花期要注意预防腐烂病和介壳虫、金龟子等病虫害的发生。

核桃树上的腐烂病对树伤害特别大，它是真菌所至的一种病害，用手指按一下树干就会留下黑水，就是我们所说的黑水病。桃树发生腐烂病怎么防呢？首先萌芽前要喷石硫合剂，要检查所有树，看有没有腐烂病，如果有，用刀在出现腐烂病的地方划个井字，涂上杀菌药，或者把70%的多菌灵100倍液涂在树上。

二三月份是草履蚧若虫和雌成虫危害的高发时期，这时应在树干上涂粘虫胶，防止若虫上树。如若虫上树，初期时需喷40%乳油800--1000倍液防治，或者是6%的吡虫啉可溶性液剂2000倍液，也可涂菊脂类农药2500倍液防治。

金龟子的防治方法：

- 1.利用成虫的假死习性，早晚镇落捕杀成虫。
- 2.可以用黑光灯诱杀幼虫，也可在林地空地夜间点火，诱集成虫扑火自焚。
- 3.在树冠喷50%辛硫磷乳油2000倍液，或2.5%000倍液。

核桃树萌芽展叶期病虫害防治技术要点

- 1.核桃花前注意腐烂病、细菌性黑斑病、介壳虫、金龟子类害虫的发生，可用合成杀菌剂加防治虫害药物进行病虫害的防治。
- 2.核桃花后注意炭疽病、褐斑病、刺蛾类害虫的发生。

核桃炭疽病的防治方法有萌芽前、展叶前或开花后连续进行药物防治。

褐斑病一般于5月中旬至6月发生，7—8月份为发病盛期。可在花期前喷1次波尔多液，落花后以及幼果早期喷2-3次多菌灵进行防治。

防治黄刺蛾，要及时摘除虫叶，集中销毁，减少虫源。