

## 5公分早熟桃树苗 5月成熟桃苗新品种

产品名称	5公分早熟桃树苗 5月成熟桃苗新品种
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

## 产品详情

### 5公分春雪桃树苗售后一条龙服务

泰安岳美苗木有限公司大棚桃栽植编辑1.苗木（1）购苗秋后至春节前购苗为宜。春节后购苗，极易发生品种混杂现象，而且优良品种。大棚株行距 $0.9 \times 1.8$ 米左右，亩栽411株左右。（2）运苗零度以上装车，苗木淋湿后封严。苗到家零度以上卸车并入室，盖严保温保湿，严禁置于零度以下的。

层积沟的四周要挖排水沟，以防积水。另外，沿沟长方向，每隔-米竖插一束从沟底到沟顶的秫秸把，作为通气孔道。春节后，温度开始回升必须注意检查萌动情况。三)质量检验新生活力强，播种后发芽率也高，幼苗生长健壮，陈则因贮藏条件和年限不同，而失去生活力的程度也不一样。特别是目前果树商品性生产，多渠道经营，新陈混杂不清，购入时又不经检验，往往出苗率很低，甚至育苗失败。因此，播种前必须经过质量的检验和发芽试验。

（3）贮苗苗木购回后如果不立即栽植，那么有两种贮存。埋土法选零度以上的天气，将苗木成捆平埋坑中，坑深60-80厘米，覆土30厘米比地面稍高，上覆草堆，不，只泼水，7度以下保存。此法易，春季土壤解冻后立即栽植。第二假植法背风处开沟，深60厘米，长宽不限，方向不限。将捆拆开，挨株斜栽于沟中，填沙土或细土，超过苗木阴阳线20-30厘米，大水灌透并填充空隙，然后盖草，以免风吹日晒而失水。2.栽植时间秋栽不缓苗，长势壮，时间在树叶变黄至封冻前。秋栽需要防寒防抽干，冬季特别严寒地区如东北、内蒙等地不能安全越冬，不能秋栽。春栽缓苗，长

势弱，时间在1-4月，土壤解冻后至发芽前，越晚长势越弱。大棚果树适于春栽，这是因为大棚秋冬季节生产蔬菜，而果苗需要低温休眠，升温不能正常生长。另外，大棚果树也可以先栽树后建棚。3.整地起垄露地行距2.5米左右，大棚行距1.8米左右。露地南北行或东西行皆可，山地可沿等高线定行。冬暖棚南北成行，由西向东排列。拱棚的行向与棚向垂直，即南北棚东西成行，东西棚南北成行。沿行起垄，垄高20厘米左右。起垄前有两种整地。（1）全园深翻地面撒施发酵粪，通常5立方米/亩左右，新棚10立方米/亩以上，旧棚有机质含量较高，可以不施粪。然后深翻40厘米左右。（2）沿行开沟深60-80厘米，宽80-100厘米，下半部填入500公斤左右杂草和熟土相混，上半部填入有机肥5立方米/亩左右，并与熟土相混，直至填满。熟土不够，可以从行间挖取，并将心土撒于行间，然后大水沉实。4.苗木处理栽前把砧木芽全刻去，只留嫁接芽，并把绑膜解去。5.配授粉树至少2个品种，隔行相间栽植或隔株相间栽植，而且不同品种必须花期相遇。

一般芽接前一个月，苗高达-厘米时摘心为宜。砧木苗抹芽是指及早抹除苗干基部-厘米以内萌发的幼芽。嫁接部位以上的副梢应全部保留，以叶面积，促进苗木加粗生长，副梢过多过密时，也可以少量间除，但保留基部功叶，采取摘心，要芽和副梢处理措施，能当年砧木嫁接率和苗木质量。病虫害苗木受到病虫为害，轻则影响苗木生长，苗木质量，重则引起缺苗断垄，甚至成片死亡，民育苗失败，因此在培育果树苗木中，必须加强对病虫害的，采取有效措施，控制发生，损失，保证苗木正常生长。

6.垄上栽植先将苗木栽到垄的一边，南北行嫁接口向东，东西行嫁接口向北。露地株距1.25米左右，大棚株距0.8米左右。填土时上下如捣蒜状，使根际充满细土。继续上提，使苗木阴阳线超出地平面5-10厘米。栽后当天大水一次浇透，水渗后继续埋土，成苗埋土超过嫁接口10厘米，芽苗埋土超过嫁接口1厘米（发芽前扒土嫁接芽并喷杀虫剂）。此时苗木即栽于垄上，千万不能深栽，阴阳线不能低于地平面。以后随果树生长继续培垄，至少高出地平面30厘米。7.苗木定干芽苗于嫁接口上方1厘米处剪平。成苗根系小的定干50厘米左右，根系大的高定干100厘米左右。8.保湿保活（1）保证成活关键的措施是保湿，垄上先盖5厘米厚的湿草，草上覆盖地膜，以保持湿度，地温。树干周围撒土，以免热气从膜孔中出来树干。（2）剪掉所有枝杈，只留一个主干，以水分蒸发。（3）苗用报纸包裹以水分蒸发，发芽时上端。也可用地膜将苗木缠一层，以水分蒸发，千万不能包多层，否则昼夜冻融交替而死苗。（4）发芽后及时抹去砧木芽，否则芽苗嫁接芽不发。（5）如果大棚栽植，栽后一个月内温度不宜超过28℃，否则苗木尚未发生新根而先发芽，蒸发失水萎蔫死亡。

中耕除草中耕可以疏松土壤，蒸发，起到抗旱保墒作用。对于轻盐碱地，松土还可以盐分上升，改变土壤理化性状。中耕结合除草，多在浇水或降雨后进行，一般-次，杂草多的地方，应锄-次。杂草不仅与苗木争夺肥水及阳光，还是病虫繁殖产所，

只有经常中耕除草，苗木才能健壮生长。拔除幅内杂草时，操作要细致，不要伤苗。追肥苗圃追肥要分-次进行。前期可施用氮肥，每次每亩施尿素-公斤，后期应施用复合肥，每次每亩-公斤，以加速苗木生长和木质化。

(6) 行间间作物不影响苗木受光，安排肥水需求量大的矮杆间作物。如果大棚栽植，5月上旬必须拔菜。9.加快生长(1)栽后每7-10天浇水一次，保持地表，直至9月。其间下一场大雨，可以少浇一次水，但下小雨不能代替浇水。(2)5-8月，每次浇水前，取2号复合肥8-10公斤/亩，预先化开，随水冲施。(3)每15天左右向叶底面喷布一次24号叶肥。

追肥不可过晚，至迟不能超过月下旬，否则砧木贪青徒长，推迟休眠期，容易受到冻害。施肥的，可把化肥均匀地撒在畦面上，随浇水，尔后结合除草，中耕-次。或在苗木行间开沟施肥，然后覆土浇水，再浅锄一次即可。另外，大雨后土壤中的氮素大量流失，若能立即追施氮肥，肥效是明显的。摘心抹芽与副梢处理砧木摘心能植株加粗生长和提前嫁接。摘心应在夏季，植株生长结束前进行。摘心过早，常植株下部大量萌发副梢，影响嫁接，过晚则失去作用。