

## 防治沃柑溃疡病，选准用药时机很重要

产品名称	防治沃柑溃疡病，选准用药时机很重要
公司名称	沧州正兴生物农药有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	品牌:小檠碱 形状:液体 产地:山东潍坊
公司地址	献县河街镇后沿
联系电话	15725679778

## 产品详情

柑橘溃疡病柑桔溃疡病是由一种称为黑腐黄单胞杆菌柑桔变种的细菌引致的病害。菌体呈短杆状，端顶生一条鞭毛，在水中能运动，在牛肉汁蛋白胨琼脂培养基上，菌落圆形，蜡黄色，有光泽，微隆起，粘稠。

病菌生长最适宜温度为20 - 30℃，最低5 - 10℃，最高35 - 38℃。故此病在热带、亚热带地区发生严重。该细菌的生长、发育需要高温高湿条件，但也能耐干燥，故在自然条件下，病菌在寄主组织内可存活数月。

多种植户由于不掌握防治技巧，导致植株周年有病，影响了沃柑的正常生长和开花结果。那么，防治沃柑溃疡病要掌握哪些技巧呢？

1

首先，春季防治要早。

春季气温回升，沃柑溃疡病就开始发生为害。在冬末春初就要开始防治沃柑溃疡病。在一月中下旬至二月上中旬，要树冠内外喷洒一次溃腐灵+有机硅，均匀喷湿树冠内外所有的枝叶，注意喷湿到树干上，这样能明显减轻溃疡病春季的发生和为害。

2、

其次，沃柑溃疡病的病菌最容易侵染幼嫩的组织，如嫩芽、花蕾、幼果等，要抓住组织幼嫩阶段进行防治。花期、展叶期喷雾（3月中旬至5月下旬）、谢花期（5月中旬）定期喷雾《靓果安》300倍+《沃丰素》600倍，杀菌预防病害的同时提高蜡质层厚度，增加免疫力。

3、

再次，是要注意在台风雨前后、暴雨来临喷药防治。

沃柑溃疡病的病菌是借伤口传染，每年夏秋季有台风雨出现时，就会严重发病。所以，要在台风雨前后各叶面喷靓果安300+沃丰素600倍，及时杀菌修复伤口，避免溃疡病的发生。

在采果后及时喷雾溃腐灵+有机硅，对园区清园处理。病枝病果及时清理出园区。