# 1公分石榴树苗基地实地挖掘品质保证

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 1公分石榴树苗基地实地挖掘品质保证 |
| 公司名称 | 泰安市岳美苗木有限公司 |
| 价格 | 2.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄 |
| 联系电话 | 13335292778 |

# 产品详情

什么样的土地适合石榴苗生长？每一种植物都需要与空气充分的接触，吸收二氧化碳，放出氧气，那么石榴苗的种植间距为多少时才能既保证坐果量，又不浪费土地资源呢？豫阳林果苗木根据多年的经验总结出以下适宜软籽石榴树苗生长的间距。五，病虫防治危害石榴的病害拥有石榴干腐病，在发病盛期即开花前后各喷一次1：1.5：160波尔多液或二分五分之三托布津可湿粉剂800—1000倍液，同时在石榴开花期及时摘除病花，病果。在刚坐住果后喷一遍杀虫杀菌药后即套袋，可以兼治疮痂和桃小食心虫，蛀螟等蛀果害虫。同时凡套袋者石榴颜色细嫩，果面光洁，均匀一致，黄绿色，是较好的高档石榴产品。稀释1500倍，喷施在石榴树正反叶面上。但凡时间间隔3--5天仍发生了蚜虫，可用2.5%扑虱蚜可湿性粉剂10g稀释1500倍喷洒正反叶面，日后每隔7--10天交叉用药喷洒一次，效果。一年6--7月份是石榴树发生了桃蛀螟的高峰季节，若不及时防治，对石榴树危害异常大。石榴果被桃蛀螟蛀后，遇高温多雨，蛀洞被灌进水，会让石榴慢慢烂掉，损害率达60%以上。此时要用50%辛硫磷乳油，稀释800倍与泥混合糊上花柄，或用。坐果前防治用33%水灭

氯乳油12ml(1支)功夫2000倍液实施喷洒。为减少桃蛀螟寄生传播，应将石榴果周边地区的叶片摘除掉。

石榴苗控制树高不要越过2.5m，软籽石榴树苗对埋土劈裂或生长衰弱的老干，要及时更新。衰弱的多年生枝，需回缩复壮，避免结果部位外移。过密的细弱枝和多余的二次枝要疏除，病枝、下垂枝、重叠枝、遮光枝也要及时疏除或回缩，以改善通风透气透光条件。

为调整生长与结果，软籽石榴树苗可在旺生枝上进行环剥。石榴花芽多生在健壮的枝条上，因是混合芽，其花有两种类型：葫芦形花芽分化发育健全，座果可靠;钟形花多可自行脱落，白白消耗营养。应加快施肥和栽培管理，促使枝条健壮。埋土与开墩11月中旬埋土，埋土厚度约10-15cm，“ 数九 ”寒天要进行检查。4月上旬选择无风天气开墩。开墩前要穿洞放风，以提高适应性。 (1)、疏除过多的结果枝或过多的营养枝(不开花结果的枝条)，并使结果枝与营养枝保持一定的比例关系，即1个果枝周围要有5-15个营养枝来提供光合产物，以保证果实长大和优质。这种比例关系要通过冬季和夏季修剪来分次完成。

(2)、疏除过密的枝条，使小枝条之间互不交叉，互不重益，并为新发枝条保留一定空间距离，这就是“ 小枝密 ”的适宜程度。而前述的“ 大枝稀 ”，其适宜程度则为80一100厘米之间，大枝指的是主枝和侧枝，其上要着生许多小枝(包括结果枝和营养枝)，如果大枝间的距离没有80-100厘米，则小枝正常生长的空间就太小了，太密集了，就会造成通风透光不良，也就难于开花和结果。

给石榴苗疏枝的主要作用有哪些1.土壤条件的优劣，直接影响石榴树的生长和结果，为此必须按照石榴树对土壤条件的要求采取深翻，中耕除草，间作和地面覆盖等措施改善土壤结构和理化性状，促使土壤中水，肥，气相互协调，以利于树体的生长，保证高产，稳产，优质。修剪时，因栽植后的石榴通常是任其自然生长，多在根际呈现丛生萌蘖，如能做到随时除掉萌蘖，可形成多主干自然半圆形的树冠。栽后第1年要任其自然生长；第2年要选留2--4个主干，除掉多余的萌枝，日后的一周实施修剪时，对所留的主干1m如下的分枝要注意除掉，使养分集中供于主干以上的树冠需要，同时要注意在每一个主干上要培养出3--5个主枝。要长放，不可短截，使枝干向周遭扩展，使树冠自然长成半圆形。

(3)、要疏除所有的病虫枝。石榴苗疏剪多余的果枝则有加强全树生长量的作用，这是因为果实少了，消耗的营养也就少了，留下的枝叶集中营养于根系生长和新梢生长。所以，通过石榴苗疏剪技术可以调节生长和结果的关系，达到既能大量开花结果又能保持一定的枝叶生长，石榴苗疏枝主要有使枝叶与花果呈一定的比例关系。什么时候种植软籽石榴树苗比较好？软籽石榴树苗是一种新品种，它的繁殖方法可以分为有性繁殖和无性繁殖两种。有性繁殖因为遗传变异大，结果晚，一般生产中不采用;无性繁殖具有变异小、挂果早、操作简单等特点，是培育石榴苗木较常用的方法。主要方法包括扦插繁殖、分株繁殖和压条繁殖等。

软籽石榴树苗通常采用扦插繁殖，一般3～10月均可种石榴树，并以6～7月为佳。

接下来，谈谈石榴种植方法：

石榴果园以避风向阳的南坡为好。栽植时间为春分至清明。石榴种植方法为先挖1米见方的树坑，再按667平方米土杂肥5000千克、优质复合肥30～35千克的比例与土混合拌匀，填压在沟(坑)底，厚35厘米左右。然后填熟土40厘米，放苗定植。株行距2米×3米，667平方米栽110株左右。

软籽石榴树苗插条以1年生的粗壮充实、节间短、芽眼饱满的中上部枝条为好。插条剪取时，底部剪口稍斜，上部距芽眼1～2厘米

，长20～25厘米。苗床土层要深厚、疏松、透气、腐生微生物少。四，衰老树的修剪大量结果20--30年生以上的树，出于贮藏营养的大量消耗，地下根系逐渐枯死，冠内枝条大量枯死，花多果少，产量下降，进入衰老期。衰老期树应从回缩复壮地上部分和深耕施肥促生新根两方面从而促进管理，达到“ 返老还童 ”一直结果的目的。就此需通过修剪米达到株形美观的效果。通常石榴可修成独干圆头或平头状；还可修成丛壮开张形；也可出产盆景石榴。采用疏剪，短截，剪除干枯枝，徒长枝，交叉枝，病弱枝，密生棱。夏季及时捕心，疏花疏果，达到通风透光，株形优美，花繁叶茂，硕果累累的效果。 [【防病虫害】主要应着重于坐果前后两个时期，初期防虫，后期防病害。石榴树从4月底到5月上，中旬易发生了刺蛾，蚜虫，蝽象，介壳虫，斜纹夜蛾等害虫。坐果后。4．修剪
缘于石榴枝条细密杂乱病害具体有白腐病，黑痘病，炭疽病。

软籽石榴树苗开浅沟，枝条稍斜，插入土中2/3，压实周围土壤，浇透清水，并经常保持湿润。生根后要勤施、薄施追肥，注意抗旱保苗。插后1年左右，苗高80厘米、茎粗1厘米以上时，即可出圃定植。

软籽石榴树苗种植时间和石榴种植方法并没有，但有个适宜的石榴种植时间和适宜的石榴种植方法。

修剪高产园中石榴要根据不相同年龄和不一样树势开展合理修剪，选择培养好骨干枝，迅速扩大树冠，以求适时结果。定植后第一年，枝叶全部保留，养树养根，促使生长。第二年按选定树形留好骨干枝，对主干上的纤细枝和地面上的萌孽全部清除，注意尽量保留利用树上的枝条，大致不可以采用短截，的确过密的枝条可疏除。有关于初果树要以注意培养侧枝和结果枝组为主，以轻剪，疏枝为主；去强枝，留中庸偏弱枝，去直立枝，留水平斜生枝；去病虫枝。三留健壮枝；多疏少截或不截，变向缓剪等，使树冠中庸而达到开好花，结好果的目的。有关于盛果期树要保持树冠原有结构，维持树势中庸健壮，关于上部过多的强旺枝要促其生长缓和，过多的侧枝要酌情疏除或缩剪，近于直立的骨干枝要注意增大生长角度，为维持树体长势可以轮换更新复壮枝组。四，冬季：冬眠不充分易导致石榴苗不开花或开花不良，石榴苗在冬季需要-2至-5°C的低温休眠。如气温低于-10°C易产生冻害，导致春季果树生长不良，基本无花或少花，所以基地技术人员提醒一旦冬季气温急

剧下降时，要稍加保护。除此另外光照越充足，花越多越鲜艳。背风，向阳，干燥的环境有利于花芽形成和开花。光照刚到时，会只长叶不开花，影响观赏效果。适宜生长温度15-20°C，冬季温度小宜低于-18°C，不然会承受到冻害。3．浇水与施肥 石榴耐旱，喜干燥的环境，浇水应掌握“ 干透浇透 ”的原则，使盆土保持“ 见干见湿，宁干不湿 ”。在开花结果期，不要浇水过多，盆土不宜过湿，要不然枝条徒长，导致落花，落果，裂果现象的产生。雨季要及时排水。2．光照与温度 光照和温度是影响花芽形成的重要条件。生一直要求全日照地栽石榴，盆栽石榴均应施足基肥，再之后入冬前再施1次腐熟的有机肥，再之后一月入冬前再施1次腐熟的有机肥，对幼树应在距树1米处环状沟施，老树则放射状沟施，深度为20厘米。盆栽石榴应按“ 薄肥勤施 ”的原则，生长旺盛期每周施1次稀肥水。不断追施磷钾肥，保花保果。