嫁接油蟠桃树苗批发油蟠7-7桃树苗新品种

| 产品名称 | 嫁接油蟠桃树苗批发油蟠7-7桃树苗新品种 |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 泰安盛果源农业科技有限公司 |
| 价格 | 7.00/棵 |
| 规格参数 | 规格:高度80公分以上 品种:油蟠7-7桃苗 产地:山东泰安 |
| 公司地址 | 山东省泰安市高新区北集坡镇 |
| 联系电话 | 05388911550 18366636868 |

产品详情

嫁接油蟠桃树苗批发油蟠7-7桃树苗新品种

蟠7-7是早熟黄肉蟠新品种,7月上旬熟,平均单果重230克,大果400克,风味浓甜,抗晚霜,极丰产,果顶干净,不裂果,肉硬味甜,极丰产。成熟时节比蟠5号晚1周左右且个大丰产。

桃为落叶性小乔木。根系属浅根性,生长迅速,伤后恢复能力强。桃芽具有早熟性,萌发力强,在主梢 迅速生长的同时,其上侧芽能相继萌发抽生二次梢、三次梢。但在二、三次梢上,无芽的盲节很多。桃 的成枝力也较强,且分枝角常较大,故干性弱,层性不明显,中心主干易早期自然消失。不同品种间分 枝角度不同,形成开张、半开张和较直立的不同树姿。隐芽少而寿命短,其自然更新能力常不如其他树 桃花芽容易形成,进入结果期早。树冠中长、中、短各类枝条均易成为结果枝。花芽为 纯花芽,在枝上侧生,每一芽内1花。顶芽为叶芽。同一节上着生2芽以上的称复芽,通常为花芽与叶芽 并生。南方品种群中的水蜜桃系和蟠桃系中、长果枝上多复花芽。结果枝可分为长果枝、中果枝、短果 枝和花束状果枝几种。长果枝长31-60厘米,为南方品种群的主要结果枝;中果枝长16-30厘米;短果枝长 5-15厘米,其上除项芽为叶芽外,其余各节多为单花芽;花束状果枝在5厘米以下,节间甚短,花芽排列 紧密,形态与短果枝雷同。不同品种的主要结果枝类型不同,同时随树龄增长,主要结果枝的类型也有 大部分桃品种能自花结实。但霞晖1号、春秀、仓方早生、砂子早生、朝晖、北农2号、 白花、鸡嘴白、五月鲜等品种花粉发育不全,自花不能正常结实。异花授粉能提高结实率。 果实发育可分快-慢-快三个时期。其中第二期为硬核期,品种间差异较大,早熟品种仅7-10天,常使胚发 育不全,或形成软核。生理落果分前后两期。前期落果在花后3-4周内发生,主要是由于受精不完全所引 起,脱落部位一般发生在结果枝与果梗之间。后期落果是受精幼果的脱落,主要发生在硬核期开始的前 后,脱落部位多数在果实与果梗的花托之间。此期正处于植株内的养分转换期,落果与碳水化合物及氮 素的供应不足有关、干旱也能促进脱落。但是,如果此期供应的氮素和水分过多,引起新梢徒长,器官 间对养分的竞争加剧,则同样会导致落果。